REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTER DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DE MEDEA

FACULTE DES SCIENCES

Mémoire

Présenté pour obtenir le diplôme de **Master**

En sciences de la nateurs et de la vie

Filière : Microbiologie

Spécialité : Microbiologie Appliquée

Par :
Deia Nesrine

Prédiction de l'hépatotoxicité médicamenteuse des structures-3D des molécules anti-inflammatoires au moyen de modèle genetic-algorithm

Soutenue publiquement le 06/25/2024 Devant le jury composé de :

KIRDI Billel MAA	U.Médéa	Président
HOCEINI Amina MCA	U.Médéa	Examinatrice
ATSAMNIA Djamel MCA	U.Médéa	Encadreur

Année universitaire 2023/2024


بسم الله الرحمن الرحيم

Remerciement

Ce travail a été réalisé au niveau du laboratoire de recherche département de sciences biologiques université Yahia Fares medea, est à cause des efforts fournis par plusieurs personnes que je ne pourrai oublier de remercier.

Mes remerciements s'adressent d'abord à Dieu, créateur de toutes choses, et le tout puissant de nous avoir donné la santé et la volonté d'entamer et de terminer ce mémoire

Aussi, je remercie mon Directeur de mémoire, le Professeur ATSAMNIA d'avoir accepté de m'encadrer dans la conception et l'élaboration de ce travail, et aussi pour le dévouement manifesté malgré toutes ses nombreuses occupations. ainsi que les Monsieur membres de jurys pour l'honneur qu'ils m'a fait d'accepter de jury ce travail.

Mon remerciement s'adresse également à tous nos professeurs Tout au long des années universitaires pour leurs générosités et la grande patience dont ils ont su faire preuve malgré leurs charges académiques et professionnelles
Remercier a moi psq je fais tout c dur travail seul

Dédicace

Je dédie ce modeste travail à Mon encadreur ***Atsamnia Djamel*** *pour la qualité de son encadrement.*

Je dédie ce travail
particulièrement mes parents:
Mon père, Ali DEIA et ma mère Naima DEIA pour tous les conseils, pour tous les encouragements et pour tous les incommensurables sacrifices consentis pour toute mes études ;

Je saisis l'occasion pour remercier mes frères Sidahmed et Islem et mes sœurs Samiha, Amel, Ibtissem, Wafa pour leur assistance matérielle, financière et scientifique, assistance sans laquelle je ne pourrai arriver au bout de ce travail scientifique;

A ma famille, elle qui m'a doté d'une éducation digne, son amour a fait de moi ce que je suis aujourd'hui.

A moi…

Liste des abréviations

(a) Médicaments retirés du marché.
(b) Principalement avec les analogues nucléosidiques antirétroviraux.
(c) Espèces réactives de l'oxygène.
(d) Avec certains médicaments, les corps cétoniques peuvent cependant augmenter au niveau plasmatique.
(e) Seulement en cas d'inhibition sévère de l'oxydation des acides gras.

µg microgrammes
ADNmt ADN mitochondrial
ALT alanine aminotransférase
AND l'acide désoxyribonucléique
ANSM Agence National de la Sécurité du Médicament
ANT adenine nucleotide translocase
AST aspartate aminotransférase
ATC anatomique thérapeutique chimique
ATP : adénosine triphosphate ;
CPA cellules présentatrices d'antigènes
CSP Code de la santé publique
DAMPs danger-associated molecular patterns
DILI Drug-Induced Liver Injury,
ERO Espèces réactives de l'oxygène
FADH2 : flavine adénine dinucléotide.
FasL Fas ligand),
GST glutathion S-transférases
HMGB1 high mobility group box 1
HPLC High-performance liquid chromatography
HPLC High-performance liquid chromatography.
HSP heat shock protein
IMC Indice de masse corporelle
LTC lymphocytes T cytotoxiques
mg milligrammes
NADPH nicotinamide adénine dinucléotide phosphate
NAPQI : N-acétyl-p-benzoquinone imine.
NK Natural Killer
OMS Organisation mondiale de la santé

PAL phosphatases alcalines

Ph. Eur : Pharmacopée européenne.

PPAR γ : peroxisome proliferator-activated receptor gamma

PTPM : pore de transition de perméabilité mitochondriale

RCP Résumé des Caractéristiques du Produit

RMN résonance magnétique nucléaire

SPC Summaries of product characteristics

TLR récepteurs Toll-like

TNF-α (Tumor Necrosis Factor),

TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand

UI unités internationales

UPR unfolded protein réponse

VDAC voltage-dependent anion channel

VLDL: very low density lipoprotein ;

γGT Gamma glutamyl transférases

LISTE DES FIGURES

Figure I. 1 les formes médicamenteuses 10
Figure I. 2 administration du médicament . 11
Figure I. 3 Le rôle de l'éthanol dans la formation de la N-acétyl-p-benzoquinone-imine (NAPQI), le métabolite toxique du paracétamol (APAP), et la dynamique de l'induction enzymatique. 25
Figure I. 4 Anatomie Hépatique 26
Figure I. 5 La structure d'un lobule hépatique 27
Figure I. 6 Anatomie des voies billiaire 28
Figure I. 7 Représentation schématique du métabolisme hépatocytaire des médicaments 28
Figure I. 8 Mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans les DILI idiosyncratiques, d'après Villanueva-Paz et al 29
Figure I. 9 Conséquences physiopathologiques de la génération d'un métabolite réactif au niveau des hépatocyte 30
Figure I. 10 Toxicité mitochondriale des médicaments, et conséquences métaboliques de cette toxicité 31
Figure I. 11 Mécanismes d'altération du métabolisme des lipides par les médicaments et conséquences physiopathologiques 33
Figure I. 12 Transporteurs membranaires de l'hépatocyte 34
Figure I. 13 Caractéristiques Histologiques de la Lésion Hépatique Induite par les Médicaments **[54]** 35
Figure I. 14 Mécanisme de la cytotoxicité a médiation cellulaire 36
Figure I. 15 Mécanisme de la cytotoxicité a médiation humorale 37
Figure I. 16 Les mécanismes de lésions hépatiques 38

Figure III. 1 Analyse de la Performances des Descripteurs 2D et 3D dans (GA) pour differents nombres de descripteurs 59
Figure III. 2 Analyse de la contribution des descripteurs 2D et 3D en (GA) 62
Figure III. 3 Contribution des descripteurs en 2D 63
Figure III. 4 Contribution des descripteurs en 3D 64
Figure III. 5 Comparaison entre modele GA developpé et base de validation 67
Figure III. 6 Comparaison entre modele GA developpé et base de validation pour differents nombre de descripteurs 68
Figure III. 7 Validation du modele de prediction avec les descripteurs 2D 69
Figure III. 8 Correlation entre degré de toxicité predite et degré de toxicité reel 70

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I. 1 Les paramètres ainsi que leurs valeurs idéales et seuils utilisés dans la fonction de fitness de l'outil d'algorithme génétique interne _____ 40

Tableau II. 1 Paramètres de performances utilisées pour l'optimisation des descripteurs pertinents._____ 54

Tableau III. 1 Performances avec Descripteurs 2D _____ 57
Tableau III. 2 Performances avec Descripteurs 3D _____ 58
Tableau III. 3 Signification des 10 descripteurs pertinents 2D _____ 61
Tableau III. 4 Signification des 30 descripteurs pertinents 3D _____ 61
Tableau III. 5 Base de données utilisée pour la validation _____ 66

Résumé

La prédiction de l'hépatotoxicité médicamenteuse est cruciale pour le développement sûr et efficace des médicaments anti-inflammatoires. Les structures 3D des molécules offrent une richesse d'informations permettant d'anticiper leur potentiel hépatotoxique. L'utilisation d'un algorithme génétique pour cette tâche permet d'optimiser la sélection des descripteurs moléculaires pertinents, améliorant ainsi la précision des prédictions.

L'intégration d'algorithmes génétiques dans la prédiction de l'hépatotoxicité des molécules anti-inflammatoires à partir de leurs structures 3D permet d'optimiser la sélection des descripteurs moléculaires, conduisant à des modèles prédictifs plus précis. Cette approche combine les puissances de la chimioinformatique et du machine learning pour améliorer la sécurité et l'efficacité des médicaments.

Mots Clés : l'hépatotoxicité, médicaments, structure 3D, molécules, anti-inflammatoires, genetic-algorithm

Summary

Prediction of médicaments hepatotoxicity is crucial for the safe and effective development of anti-inflammatory médicaments. The 3D structures of molecules offer a wealth of information to anticipate their hepatotoxic potential.

The integration of genetic algorithms in the prediction of the hepatotoxicity of anti-inflammatory molecules from their 3D structures makes it possible to optimize the selection of molecular descriptors, leading to more accurate predictive models. This approach combines the powers of chemoinformatics and machine learning to improve the safety and efficacy of médicaments.

Keywords: hepatotoxicity, médicaments, 3D structure, molecules, anti-inflammatories, genetic-algorithm

ملخص

يعد التنبؤ بالسمية الكبدية للأدوية أمرا بالغ الأهمية للتطوير الآمن والفعال للأدوية المضادة للالتهابات. توفر هياكل 3D للجزيئات ثروة من المعلومات لتوقع إمكاناتها السامة للكبد. يسمح استخدام الخوارزمية الجينية لهذه المهمة بتحسين اختيار الواصفات الجزيئية ذات الصلة ، وبالتالي تحسين دقة التنبؤات.

إن دمج الخوارزميات الجينية في التنبؤ بالسمية الكبدية للجزيئات المضادة للالتهابات من هياكلها 3D يجعل من الممكن تحسين اختيار الواصفات الجزيئية ، مما يؤدي إلى نماذج تنبؤية أكثر دقة. يجمع هذا النهج بين قوى المعلوماتية الكيميائية والتعلم الآلي لتحسين سلامة الأدوية وفعاليتها.

الكلمات المفتاحية: السمية الكبدية ، المخدرات ، بنية 3D ، الجزيئات ، مضادات الالتهاب ، الخوارزمية الجينية

Introduction

INTRODUCTION

L'avènement de la pharmacologie moderne a indéniablement amélioré la qualité de vie en permettant le traitement efficace d'un large éventail de conditions médicales. Cependant, le développement de nouveaux médicaments est un processus complexe et souvent semé d'embûches, car il nécessite non seulement une efficacité thérapeutique, mais également une sécurité d'emploi optimale. Parmi les risques les plus redoutables associés à l'utilisation de médicaments se trouve l'hépatotoxicité, une forme de toxicité hépatique induite par les médicaments, qui peut entraîner des dommages graves, voire mortels, au foie.

L'hépatotoxicité médicamenteuse pose un défi majeur pour les chercheurs et les cliniciens, car elle peut se manifester de différentes manières, telles que des lésions hépatocellulaires, une cholestase intra-hépatique ou une hépatite fulminante. Ces réactions indésirables peuvent survenir à n'importe quelle étape de la vie d'un médicament, de la phase de développement préclinique à l'utilisation clinique généralisée, et sont souvent imprévisibles. Par conséquent, il est impératif d'adopter des approches novatrices pour évaluer et prédire le risque potentiel d'hépatotoxicité des médicaments dès les premières phases de leur développement.

Dans cette optique, l'utilisation de techniques de modélisation informatique offre une solution prometteuse. Ces techniques permettent d'analyser et de prédire les propriétés pharmacologiques des composés chimiques, y compris leur potentiel hépatotoxique, en se basant sur des données structurales et fonctionnelles. Parmi les approches de modélisation, les modèles génétiques algorithmiques se distinguent par leur capacité à explorer de vastes espaces de solutions et à identifier des relations complexes entre les structures moléculaires et leurs effets biologiques.

Dans ce cadre, notre projet de fin d'études se propose de développer un modèle prédictif de la toxicité hépatique des médicaments en utilisant des descripteurs moléculaires et des algorithmes génétiques.

Les travaux décrits dans ce mémoire font l’objet de trois grandes parties, une etude bibliographique, Methodok et partie resultats et discution.

Dans la partie étude bibliographique nous exposons des généralités sur les médicaments et sur leurs utlisation. La partie experimentale regroupe toutes les bases théoriques nécessaires pour aboutir à un modèle pour predire la toxicité hypatique du foie, en utilisant l’algorithme genetique (GA).

INTRODUCTION

Notre méthodologie se divise en plusieurs étapes clés : collecte et prétraitement des données, génération des descripteurs moléculaires, association des descripteurs aux degrés de toxicité, et enfin, création et validation du modèle prédictif. Nous avons collecté des données à partir de sources publiques et génomiques telles que PubMed et DrugBank, en mettant l'accent sur les informations pharmacologiques et cliniques pertinentes. Ces données ont ensuite été nettoyées et normalisées pour garantir leur qualité et pertinence.

Les descripteurs moléculaires ont été générés à l'aide du logiciel PaDEL, permettant de capturer des caractéristiques 2D et 3D des molécules de médicaments. Ces descripteurs, une fois sélectionnés et associés aux degrés de toxicité hépatique, ont été utilisés pour construire un modèle prédictif basé sur des algorithmes génétiques. La performance du modèle a été évaluée en utilisant divers paramètres statistiques et techniques de validation croisée.

Ce projet vise non seulement à améliorer la compréhension de la toxicité hépatique des médicaments, mais aussi à fournir un outil pratique pour prédire cette toxicité, contribuant ainsi à la sécurité des patients et à l'optimisation des processus de développement des médicaments.

I-Synthèse bibliographique

I-SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

I.1-LES MEDICAMENTS

I.1.1-L'histoire de la découverte de médicaments

L'histoire de la découverte de médicaments est riche et complexe, couvrant plusieurs millénaires et touchant à des avancées significatives dans la science, la médecine, et la technologie

-Voici un aperçu des principales étapes et découvertes marquantes dans ce domaine :

- **Antiquité :**

Plantes Médicinales : Les premières utilisations de plantes médicinales remontent à l'Antiquité. Les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs et les Romains utilisaient des extraits de plantes pour traiter diverses maladies. **[1].**

- **Moyen Âge :**

Médecine Arabe et Alchimie : Les savants arabes, comme Avicenne (Ibn Sina), ont contribué significativement à la pharmacologie en documentant l'utilisation de nombreuses substances médicinales et en améliorant les méthodes d'extraction et de purification **[2].**

- **Renaissance et Époque Moderne :**

Paracelse : Ce médecin suisse du XVIe siècle a révolutionné la médecine en introduisant l'idée que la dose fait le poison (« Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison »).

- **XVIIIe et XIXe siècles :**

Naissance de la Chimie Pharmaceutique : L'isolement de substances actives à partir de plantes, comme la morphine à partir de l'opium (Friedrich Sertürner, 1804), a marqué le début de la chimie pharmaceutique.

Vaccination : Edward Jenner a développé le premier vaccin contre la variole en 1796, ouvrant la voie à la vaccination comme méthode de prévention des maladies **[3].**

- **XXe siècle**

Pénicilline : En 1928, Alexander Fleming a découvert par accident la pénicilline, le premier antibiotique, marquant le début de l'ère des antibiotiques.

Chimiothérapie : Les premières utilisations de médicaments pour traiter le cancer, comme le méthotrexate, ont été développées

Psychotropes : La découverte de médicaments psychotropes tels que la chlorpromazine pour traiter la schizophrénie a transformé la psychiatrie**.**

- **XXIe siècle**

Biotechnologie et Médicaments Biologiques : Le développement de médicaments biologiques, comme les anticorps monoclonaux (par exemple, l'herceptine pour le cancer du sein), a révolutionné le traitement de nombreuses maladies **[4].**

Thérapies Génétiques et Cellulaires : Les avancées dans la thérapie génique et cellulaire, y compris l'édition génomique avec CRISPR, ouvrent de nouvelles perspectives pour le traitement de maladies génétiques

- **Méthodologies Modernes**

Criblage à Haut Débit : Utilisation de robots et de logiciels pour tester rapidement des milliers de composés chimiques afin de trouver des candidats médicaments potentiels

Modélisation Moléculaire : Utilisation de simulations informatiques pour concevoir des molécules de médicaments ciblées **[5].**

Approches Multi-Omics : Intégration de données génomiques, transcriptomiques, protéomiques et métabolomiques pour découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques et développer des médicaments personnalisés.

I.1.2- Definitions des medicaments:

I.1.2.1-Définition générale des médicaments :

« On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique **» [6].**

► Le médicament est un produit de consommation soumis à une réglementation très stricte et encadré en France par l'Agence National de la Sécurité du Médicament et des produits de

Santé ou ANSM (agence créée par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire des médicaments et des produits de santé **[7].**

► Chaque médicament est caractérisé par son rapport bénéfice/risque [CSP, Art. L5121-9] **[8]** et doit être utilisé dans des conditions parfaitement définies dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP ; Summaries of product characteristics, SPC) : dans une situation pathologique particulière, à une posologie adaptée, selon un schéma thérapeutique défini, en respectant les précautions d'emploi [HAS, 2011] [ANSM, 2014].

► Les médicaments sont des substances ou composés chimiques utilisés pour diagnostiquer, traiter, prévenir ou soulager les symptômes de maladies et de troubles médicaux chez les humains et les animaux **[9].** Ils interagissent avec le corps en modifiant des processus biologiques, chimiques ou physiologiques afin de produire un effet thérapeutique **[10].**

Les médicaments peuvent cibler des organismes pathogènes comme les bactéries, virus ou parasites, ou agir sur des processus corporels spécifiques pour traiter des conditions telles que l'hypertension, le diabète ou la douleur **[11].** Ils sont disponibles sous diverses formes, y compris comprimés, capsules, sirops, pommades, gouttes, et sont administrés par des voies variées selon le type de médicament et les besoins du patient. L'utilisation des médicaments doit être supervisée par des professionnels de santé qualifiés en raison des risques d'effets secondaires indésirables ou d'interactions avec d'autres médicaments ou conditions médicales **[12].**

I.1.2-2-Les médicaments selon la pharmacopée européens

Les normes de qualité officielles pour les médicaments et leurs composants en Europe sont essentiellement établies par la Pharmacopée Européenne (Ph. Eure.). Elle offre une fondation scientifique pour assurer la qualité à toutes les étapes du cycle de vie des produits, apportant ainsi son soutien à l'industrie pharmaceutique et aux systèmes médicaux. Ces normes sont légalement obligatoires en vertu de la Convention du Conseil de l'Europe sur l'élaboration d'une Pharmacopée européenne. **[13]**

I.1.3-L'origine des médicaments :

- **Naturelle :** Les médicaments appartiennent aux trois règnes: végétale, animale et minérale

Végétale : Les médicaments d'origine végétale sont des médicaments qui sont extraits ou dérivés de plantes. Ils sont utilisés depuis des millénaires dans diverses cultures pour traiter une variété de conditions médicales **[14].**

Animale : Ces médicaments sont dérivés d'animaux ou de leurs tissus, tels que l'insuline, qui est produite à partir du pancréas des porcs et des bovins, ou l'héparine, qui est extraite de l'intestin des porcs **[15].**

Minérale : La plupart des médicaments sont fabriqués à partir de produits chimiques synthétiques, mais certains médicaments peuvent également être dérivés de sources minérales naturelles **[16].**

- **Synthétique**: Ces médicaments sont produits à partir de produits chimiques synthétiques, tels que l'aspirine ou le paracétamol **[17].**
- **Médicaments semi-synthétiques:** Ces médicaments sont produits à partir d'une combinaison de produits chimiques synthétiques et naturels, tels que la pénicilline, qui est produite à partir de la moisissure Penicillium, mais est ensuite modifiée en laboratoire pour créer des antibiotiques plus efficaces **[18].**
- **Microbiologique :** L'origine microbiologique des médicaments fait référence à leur source de production à partir de micro-organismes tels que des bactéries, des champignons et des virus. Certains médicaments sont produits à partir de micro-organismes vivants, tandis que d'autres sont produits à partir de produits dérivés de micro-organismes **[19].**

I.1.4-Les différentes formes des médicaments :

La forme pharmaceutique du médicament (également appelée forme galénique) doit permettre à la substance active d'atteindre l'organe visé le plus vite et le mieux possible, C'est un élément important du médicament, car un mode d'administration adapté est gage de meilleure efficacité et de moindre risque. **[23]**

- **Les formes orales :** Les formes orales sont les plus utilisées. Elles représentent 80 % des formes pharmaceutiques.

Les comprimés : Les comprimés sont des formes solides de médicaments qui sont fabriquées en comprimant une poudre ou un mélange de poudres. Ils sont souvent recouverts d'une couche pour faciliter la prise et l'administration. **[24].**

Les gélule : Les gélules sont des formes solides de médicaments qui sont constituées d'une coque en gélatine contenant une poudre ou un liquide.

Les formes liquides : Ce sont les formes les mieux adaptées pour les enfants, car elles sont plus faciles à avaler et peuvent permettre une adaptation des doses en fonction du poids. Elles peuvent être aromatisées pour être mieux acceptées **[25].**

Sirops : Les sirops sont des formes liquides de médicaments qui sont constituées d'un mélange de médicaments, d'eau et de sucre. Ils sont souvent utilisés pour les médicaments destinés aux enfants ou aux personnes ayant des difficultés à avaler des comprimés ou des gélules. Les sirops peuvent également être conçus pour une libération prolongée **[26].**

- **Les formes dermiques:**

Gels : Les gels sont des formes semi-solides de médicaments qui sont constituées d'une base d'eau ou d'alcool dans laquelle le médicament est incorporé.**. [27]**

Crèmes : Les crèmes sont des formes pharmaceutiques dermiques à base de substances actives et d'excipients, destinées à une application cutanée ou muqueuse. Les crèmes ont une texture légère, non grasse et sont rapidement absorbées par la peau. **[28].**

Pommade : Les pommades sont des formes semi-solides de médicaments qui sont souvent utilisées pour les médicaments topiques destinés à être appliqués sur la peau. Les pommades sont plus épaisses et plus adhérentes que les crèmes **[27]**

- **Les formes inhalées** : Les formes inhalées permettent d'administrer de fines particules de médicament directement dans les bronches. Ils sont utilisés dans le traitement de l'asthme et de la bronchite chronique. L'aérosol muni d'une valve doseuse délivre une dose fixe de médicament lors d'une inspiration profonde. **[23]**

- **Les formes injectables :**

Les solutions injectables :

Les solutions injectables sont des médicaments liquides stériles destinés à être administrés par injection. Elles sont utilisées pour une variété de médicaments, notamment les antibiotiques, les antiviraux et les médicaments anticancéreux.

Les lyophilisats injectables :

Les lyophilisats injectables sont des médicaments solides qui doivent être dissous dans un liquide avant l'injection. Ils sont souvent utilisés pour les médicaments nécessitant une stabilité prolongée, tels que les vaccins. **[29]**

- **Les formes rectales :**

Le suppositoire permet de traiter des personnes ayant des difficultés à avaler les médicaments ou de traiter localement certaines infections du rectum ou de l'anus. Il doit être conservé à l'abri de la chaleur **[23].**




Figure I. 1 les formes médicamenteuses **[30]**

I.1.5-Les différentes voies d'administration des médicaments :

- **Voie locale** : La voie locale d'administration des médicaments correspond à l'application du médicament directement sur la zone à traiter. Cette voie d'administration est utilisée pour traiter des infections localisées telles que les maladies dermatologiques **[31].**
- **Voie orale :** La voie orale est l'une des voies les plus courantes pour administrer un médicament. **[32]**
- **Voie parentérale :** La voie parentérale comprend toutes les voies d'administration où le médicament est administré directement dans la circulation sanguine, contournant ainsi les voies d'absorption normales. **[29].**
- **Voie sous-cutanée** : La voie sous-cutanée est une voie d'administration des médicaments qui consiste en l'injection d'une substance dans les tissus sous-cutanés, c'est-à-dire situés entre la peau et les muscles. **[33]**
- **Voie intramusculaires:** La voie intramusculaire (IM) est une méthode courante d'administration de médicaments. Elle est utilisée pour les médicaments qui ne peuvent pas être administrés par voie orale ou qui nécessitent une absorption rapide et complète.

- **Voie intraveineuse :** Les médicaments sont administrés directement dans une veine à l'aide d'une aiguille ou d'un cathéter. Cette voie d'administration est souvent utilisée pour les médicaments qui doivent agir rapidement ou pour les patients qui ne peuvent pas prendre de médicaments par voie orale **[34]**
- **Voie rectale :** La voie rectale consiste en l'administration d'un médicament sous forme de suppositoire ou d'enema. Le médicament est absorbé par la muqueuse rectale et passe ensuite dans la circulation sanguine **[35]**
- **Voie respiratoire** : Cette voie consiste à administrer un médicament dans l'appareil respiratoire par inhalation ou par instillation.

L'instillation Consiste à administrer dans le nez un médicament liquide, à l'aide d'un compte-gouttes ou d'un atomiseur **[36].**

- **La voie cutanée :** Les médicaments peuvent être administrés par voie cutanée à travers la peau sous forme de patchs transdermiques, de crèmes ou de gels. **[37].**




Figure I. 2 administration du médicament **[38].**

I.1.6-Classification des médicaments

La classification des médicaments est un système qui organise les médicaments en fonction de différents critères tels que leur mode d'action, leur composition chimique, leur usage thérapeutique et leur statut juridique.

I.1.6.1-Classification selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

L'OMS utilise le système de classification anatomique thérapeutique chimique (ATC), divisant les médicaments en cinq niveaux selon l'organe ou le système qu'ils affectent et leurs propriétés thérapeutiques et chimiques :

Niveau principal : Groupe anatomique (ex. : système nerveux).

Sous-groupe thérapeutique : Usage thérapeutique (ex. : analgésiques).

Sous-groupe pharmacologique : Type d'action (ex. : opioïdes).

Sous-groupe chimique/thérapeutique/pharmacologique : Propriétés spécifiques (ex. : alcaloïdes de l'opium).

I.1.6.2-Classification par Usage Thérapeutique

Antibiotiques : Inhibent des processus bactériens essentiels (ex. : Amoxicilline).

Antiviraux : Inhibent la réplication virale (ex. : Acyclovir).

Antifongiques : Inhibent la paroi cellulaire fongique (ex. : Fluconazole, Terbinafine).

Antiparasitaires : Ciblent et détruisent les parasites (ex. : Métronidazole, Ivermectine).

Antidépresseurs : Modifient les niveaux de neurotransmetteurs (ex. : Fluoxétine, Sertraline).

Anxiolytiques : Augmentent l'activité du GABA (ex. : Diazépam, Lorazépam).

Antipsychotiques : Bloquent les récepteurs de la dopamine (ex. : Rispéridone, Olanzapine).

Antihypertenseurs : Abaissent la pression artérielle (ex. : Lisinopril, Amlodipine).

Analgésiques/Antalgiques : Soulagent la douleur (ex. : Paracétamol, Ibuprofène).

Antipyrétiques : Réduisent la fièvre (ex. : Paracétamol, Aspirine).

Anti-inflammatoires : Réduisent l'inflammation (ex. : Ibuprofène, Naproxène).

I.1.6.3. Classification par Mode d'Action

Inhibiteurs Enzymatiques : Bloquent une enzyme spécifique (ex. : Donepezil pour l'Alzheimer).

Agonistes : Activent les récepteurs cellulaires (ex. : Morphine pour la douleur).

Antagonistes : Bloquent l'action des agonistes (ex. : Propranolol pour l'hypertension).

Modulateurs Allostériques : Modifient l'activité sans se lier au site actif (utilisés pour diverses conditions).

I.1.6.4. Classification par Structure Chimique

Beta-lactamines : Pénicillines, céphalosporines.

Macrolides : Érythromycine, azithromycine.

Aminoglycosides : Gentamicine, tobramycine.

Sulfonamides : Sulfaméthoxazole.

Quinolones : Ciprofloxacine, lévofloxacine. **[39]**

I.1.6.5. Classification par Statut Juridique

Cette classification dépend de la régulation des médicaments par les autorités sanitaires et leur disponibilité pour les patients.

- **Médicaments sur Ordonnance :**

Les médicaments sur ordonnance nécessitent une prescription délivrée par un professionnel de la santé, comme un médecin. Ils sont destinés à traiter des affections plus graves ou chroniques, nécessitant un suivi médical régulier. Plus puissants que les médicaments en vente libre, ils peuvent avoir des effets secondaires importants.

- **Médicaments en Vente Libre :**

Les médicaments en vente libre peuvent être achetés sans prescription médicale et sont disponibles dans divers points de vente, comme les pharmacies et les supermarchés. Ils sont utilisés pour traiter des affections mineures et des symptômes courants (maux de tête, douleurs légères, allergies, toux, rhume). Considérés comme sécuritaires lorsqu'utilisés conformément aux instructions, il est néanmoins important de lire attentivement les étiquettes et de consulter un pharmacien ou un professionnel de la santé en cas de questions. **[40]**

- **Médicaments Stupéfiants et Psychotropes :**

Médicaments soumis à une réglementation stricte en raison de leur potentiel d'abus et de dépendance (par exemple, morphine, méthadone).

- **Classification par Origine**

Cette classification se base sur la source des médicaments.

Médicaments Synthétiques : Médicaments fabriqués par des processus chimiques (par exemple, ibuprofène, paracétamol).

Médicaments Biologiques : Médicaments produits à partir de sources biologiques comme les cellules vivantes (par exemple, vaccins, insuline, anticorps monoclonaux).

Médicaments à Base de Plantes : Médicaments dérivés de sources végétales (par exemple, digitaline, quinine) **[41]**

I.1.7-La synthèse des médicaments

La synthèse des médicaments implique plusieurs étapes complexes et spécifiques, allant de la conception moléculaire à la production industrielle.

- **Conception et découverte des molécules**

Identifier une cible biologique (protéine ou récepteur).

Utiliser des techniques de criblage pour trouver des composés chimiques.

Modéliser et optimiser les molécules.

Synthétiser la molécule principale.

Optimiser les conditions de réaction.

Effectuer une synthèse en plusieurs étapes.

- **Purification et caractérisation**

Purifier le produit par chromatographie ou recristallisation.

Confirmer la structure chimique et la pureté par des techniques analytiques (RMN, HPLC).

- **Tests biologiques et pharmacologiques**

Tests in vitro : Tester le composé sur des cellules ou des tissus en laboratoire pour vérifier son activité biologique.

Tests in vivo : Tester le composé sur des modèles animaux pour étudier son effet dans un organisme vivant.

- **Développement pharmaceutique**

Formuler une forme pharmaceutique adaptée (comprimé, injection).

Étudier la stabilité du médicament.

Adapter le procédé pour la production à grande échelle.

- **Essais cliniques**

Phase I : Tester la sécurité et la pharmacocinétique du médicament chez un petit nombre de volontaires sains.

Phase II : Évaluer l'efficacité et les effets secondaires chez un plus grand nombre de patients atteints de la maladie cible.

Phase III : Confirmer l'efficacité et surveiller les effets secondaires dans de larges populations de patients.

- **Autorisation et commercialisation**

Soumission réglementaire : Soumettre les données d'essais cliniques et de fabrication aux agences réglementaires (FDA, EMA, etc.) pour approbation.

Production industrielle : Mettre en place la production à grande échelle, y compris les contrôles de qualité.

Distribution et commercialisation : Distribuer le médicament aux pharmacies et hôpitaux pour qu'il soit disponible aux patients.**[42]**

I.1.8-Utilisation des Médicaments

Posologie et Administration

- **Posologie :**

La posologie d'un médicament fait référence à la quantité exacte à prendre à chaque dose. Cette quantité est généralement exprimée en milligrammes (mg), en microgrammes (µg), ou en unités internationales (UI), selon le médicament. La posologie peut varier en fonction de plusieurs facteurs tels que le poids du patient, la gravité de la maladie, la réponse individuelle au traitement, et d'autres conditions médicales sous-jacentes. (UI).

- **Mode d'Administration :**

Les médicaments peuvent être administrés par différentes voies, chacune ayant des caractéristiques spécifiques adaptées aux besoins du traitement.

- **Moment de Prise des Médicaments**

Le moment de la prise des médicaments est crucial pour assurer une efficacité maximale et minimiser les effets secondaires. Les recommandations spécifiques varient selon le type de médicament et sa pharmacocinétique.

Médicaments à Prendre à Jeun :

Certains médicaments sont mieux absorbés lorsqu'ils ne sont pas en compétition avec des aliments dans l'estomac.

Médicaments à Prendre avec de la Nourriture :

Prendre un médicament avec de la nourriture peut réduire les effets secondaires gastro-intestinaux et améliorer l'absorption de certains médicaments. Par exemple, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l'ibuprofène.

Médicaments à Prendre à des Moments Spécifiques de la Journée :

Certains médicaments doivent être pris à des moments spécifiques de la journée pour optimiser leur efficacité et minimiser les effets secondaires. Par exemple, certains antihypertenseurs et corticostéroïdes.

- **Durée du Traitement :**

La durée du traitement peut varier en fonction de la maladie traitée et de sa gravité. Il est important de ne pas interrompre prématurément un traitement sans l'avis d'un professionnel de la santé.

- **Effets Secondaires et Précautions :**

Chaque médicament peut entraîner des effets secondaires potentiels. Il est crucial de lire la notice d'information du médicament pour connaître ces effets secondaires et savoir quand contacter un professionnel de la santé. Il est aussi important de comprendre les précautions spécifiques.

- **Stockage et Élimination :**

Les médicaments doivent être conservés dans des conditions spécifiques pour garantir leur efficacité et leur sécurité. De plus, il est important de savoir comment éliminer correctement les médicaments périmés ou non utilisés pour éviter toute contamination de l'environnement.

- **Suivi Médical :**

Il est recommandé de consulter régulièrement un professionnel de la santé pendant le traitement médicamenteux pour surveiller les progrès, ajuster la posologie si nécessaire, et évaluer les effets secondaires éventuels **[43]**

I.1.9-Le cadre juridique

I.1.9.1-Le cadre juridique Algérien national

Sur l'utilisation des médicaments est généralement défini par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Les principaux aspects de ce règlement comprennent des directives sur la fabrication, la distribution, la prescription et l'utilisation des médicaments dans le pays. Certaines des principales caractéristiques du règlement national algérien sur l'utilisation des médicaments pourraient inclure :

Enregistrement des médicaments :

En Algérie, l'enregistrement des médicaments et les directives concernant la prescription médicale sont régis par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ainsi que par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

- **Processus d'enregistrement :** Une demande d'enregistrement, accompagnée de données scientifiques prouvant l'efficacité, la sécurité et la qualité du médicament, doit être soumise aux autorités compétentes.
- **Évaluation :** Les autorités, telles que l'ANSM, examinent les données soumises pour s'assurer que le médicament respecte les normes de qualité, de sécurité et d'efficacité.
- **Délivrance de l'autorisation** : Si le médicament répond aux normes réglementaires, une autorisation d'enregistrement est délivrée, permettant sa commercialisation en Algérie.
- **Suivi post-commercialisation :** Une fois sur le marché, le médicament fait l'objet d'un suivi continu pour surveiller les effets indésirables et les problèmes de qualité. **[44]**

Prescription médicale :

►Professionnels autorisés à prescrire : En Algérie, seuls les professionnels de la santé qualifiés, tels que les médecins, sont autorisés à prescrire des médicaments soumis à prescription médicale. **[45]**

►Rôle des pharmaciens : Les pharmaciens jouent un rôle crucial dans la délivrance des médicaments sur ordonnance.

► Contrôle des substances réglementées : Certains médicaments, tels que les psychotropes et les substances contrôlées, sont soumis à des réglementations spéciales en matière de prescription et de délivrance pour prévenir leur mauvaise utilisation ou leur abus.

En résumé, en Algérie, l'enregistrement des médicaments et la prescription médicale sont des processus réglementés visant à garantir la sécurité, l'efficacité et la qualité des médicaments disponibles sur le marché, ainsi qu'à assurer une utilisation appropriée par les professionnels de la santé et les patients **[46]**

Publicité des médicaments :

En Algérie, la publicité des médicaments est soumise à des règles strictes énoncées dans la loi et les réglementations relatives à la santé publique et à la pratique pharmaceutique.
► Autorisation préalable : Toute publicité de médicaments doit être autorisée préalablement par les autorités compétentes, telles que le Ministère de la Santé ou l'Agence Nationale des Médicaments.

► Contenu précis : La publicité des médicaments doit contenir des informations précises et objectives sur le produit, y compris son nom commercial, sa composition, ses indications thérapeutiques, ses contre-indications, ses effets indésirables et son mode d'administration.

► Interdiction de fausses allégations : Il est strictement interdit de faire des déclarations fausses, trompeuses ou exagérées concernant les propriétés ou l'efficacité d'un médicament dans la publicité

► Respect de l'éthique médicale : La publicité ne doit pas porter atteinte à l'éthique médicale et ne doit pas inciter à l'automédication ou à une utilisation inappropriée des médicaments.

► Public cible : La publicité des médicaments doit être destinée uniquement aux professionnels de la santé et ne doit pas être adressée au grand public.

► Contrôle et sanctions : Les autorités compétentes surveillent étroitement la conformité des publicités de médicaments aux réglementations en vigueur. Des sanctions peuvent être imposées en cas de non-respect des règles, telles que des amendes ou la suspension de l'autorisation de publicité.

Importation et distribution :

Les procédures d'importation et de distribution des médicaments en Algérie sont également réglementées pour assurer la qualité et la sécurité des produits :

Autorisation d'importation : Une autorisation doit être obtenue du Ministère de la Santé, avec des documents détaillant les spécifications et la qualité du médicament.

Licence de distribution : Les distributeurs doivent obtenir une licence démontrant leur capacité à stocker et distribuer les médicaments conformément aux bonnes pratiques de distribution (BPD).

Systèmes de contrôle qualité : Les importateurs et distributeurs doivent mettre en place des systèmes de contrôle qualité, comprenant des inspections régulières et des tests de qualité.

Traçabilité et documentation : Les entreprises doivent maintenir des systèmes de traçabilité pour chaque lot de médicaments, incluant des dossiers détaillés des mouvements de stock.

Surveillance et inspections : Les autorités, comme la Direction de la Pharmacie et des Équipements Médicaux (DPEM), effectuent des inspections régulières pour assurer la conformité aux normes et réglementations. **[47]**

Pharmacovigilance :

En Algérie, la pharmacovigilance est un aspect crucial de la surveillance de la sécurité des médicaments et est réglementée par le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH).

►Cadre réglementaire : La pharmacovigilance est régie par la loi n° 17-04 du 15 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 7 septembre 2017 relative à la santé en Algérie. Cette loi établit les principes généraux de la pharmacovigilance, y compris les responsabilités des autorités de santé, des professionnels de la santé et des entreprises pharmaceutiques dans le signalement et la gestion des effets indésirables des médicaments.

►Centre National de Pharmacovigilance : En Algérie, le Centre National de Pharmacovigilance (CNPV) est chargé de coordonner les activités de pharmacovigilance à l'échelle nationale. Le CNPV est responsable de la collecte, de l'évaluation et de la gestion des rapports d'effets indésirables des médicaments.

►Déclaration des effets indésirables : Les professionnels de la santé, y compris les médecins, les pharmaciens et les autres professionnels de la santé, ainsi que les patients, sont encouragés à signaler tout effet indésirable suspecté d'être lié à un médicament au CNPV.

►Évaluation et gestion des risques : Le CNPV évalue les rapports d'effets indésirables pour déterminer si des mesures sont nécessaires pour réduire les risques associés à l'utilisation des médicaments.

►Formation et sensibilisation : Le CNPV organise des activités de formation et de sensibilisation pour les professionnels de la santé afin de promouvoir la déclaration des effets indésirables et de renforcer la surveillance de la sécurité des médicaments en Algérie. **[48]**

Prix des médicaments :

►En Algérie, le contrôle des prix des médicaments est un élément essentiel pour assurer l'accessibilité des médicaments à la population. Voici des informations plus détaillées sur ce mécanisme :

►Cadre réglementaire : Le contrôle des prix des médicaments est réglementé par plusieurs lois et décrets en Algérie, notamment la loi n° 18-04 du 10 juin 2018 relative à la santé, qui établit les principes généraux du système de santé, y compris les dispositions concernant les médicaments.

►Autorité de régulation des prix : En Algérie, l'Autorité Nationale de Régulation des Prix (ANRP) est chargée de réguler les prix des biens et services, y compris les médicaments. L'ANRP établit des listes de prix de référence pour différents médicaments en fonction de leur classe thérapeutique, de leur formulation et de leur mode d'administration.

Bonnes pratiques de fabrication :

►Les bonnes pratiques de fabrication (BPF) sont des normes réglementaires et des directives internationales qui visent à assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits pharmaceutiques. Elles s'appliquent à toutes les étapes de la fabrication, du contrôle qualité, de l'emballage et du stockage des médicaments. Voici quelques informations plus détaillées sur les BPF :

►Conformité réglementaire : Les BPF sont établies par des autorités réglementaires nationales et internationales telles que la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, l'Agence européenne des médicaments (EMA) en Europe et d'autres organismes similaires dans d'autres régions du monde.

► Infrastructure et équipements : Les installations de fabrication doivent être conçues de manière à garantir des conditions de production optimales.

► Qualification du personnel : Les employés impliqués dans la fabrication, le contrôle qualité et la distribution des médicaments doivent être formés de manière adéquate et avoir les compétences nécessaires pour effectuer leurs tâches conformément aux BPF.

► Documentation et enregistrements : La tenue de registres précis et détaillés est essentielle pour démontrer la conformité aux BPF. Cela inclut la documentation de toutes les étapes du processus de fabrication, du sourcing des matières premières à la distribution des produits finis.

► Contrôle qualité et assurance qualité : Les fabricants sont tenus de mettre en place des systèmes de contrôle qualité rigoureux pour s'assurer que les produits répondent aux normes spécifiées en termes de puissance, de pureté et de stabilité.

► Validation des processus : Avant de mettre un nouveau processus de fabrication en œuvre, les fabricants doivent le valider pour s'assurer qu'il est capable de produire des produits conformes aux spécifications.

► Gestion des risques : Les fabricants doivent identifier et évaluer les risques potentiels pour la qualité et la sécurité des produits tout au long du cycle de vie, de la conception à la distribution.

► En respectant ces bonnes pratiques de fabrication, les fabricants de médicaments peuvent garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité de leurs produits, ce qui est essentiel pour protéger la santé des patients et maintenir la confiance du public dans l'industrie pharmaceutique.

► Fixation des prix : Les prix des médicaments sont généralement fixés par l'ANRP en consultation avec le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH) et d'autres parties prenantes de la santé. **[49]**

► Révision périodique des prix : Les prix des médicaments font l'objet d'une révision périodique pour tenir compte des fluctuations des coûts de production, des évolutions du marché et des besoins de la population. L'ANRP peut ajuster les prix en conséquence pour garantir qu'ils restent abordables tout en assurant la viabilité économique de l'industrie pharmaceutique.

► Contrôle et sanctions : L'ANRP surveille régulièrement le respect des prix fixés pour les médicaments par les pharmacies et les distributeurs.

►Transparence et information : Les prix des médicaments fixés par l'ANRP sont généralement publiés et disponibles pour consultation par les professionnels de la santé et le grand public.

Ces mécanismes de contrôle des prix des médicaments en Algérie visent à garantir que les médicaments restent abordables et accessibles à la population tout en assurant la viabilité économique de l'industrie pharmaceutique. Ils contribuent également à promouvoir l'équité dans l'accès aux soins de santé **[50]**

I.1.9.2-Règlements d'utilisation des médicaments à l'échelle mondiale

Les médicaments jouent un rôle crucial dans la santé publique mondiale, et leur utilisation est régulée par divers organismes pour assurer leur sécurité, leur efficacité et leur accessibilité.

Organisation mondiale de la Santé (OMS) :

L'OMS publie des rapports sur les politiques pharmaceutiques, l'accès aux médicaments essentiels, et la résistance antimicrobienne. Elle élabore des directives pour la prescription rationnelle et l'utilisation appropriée des antibiotiques, ainsi que pour la sécurité des médicaments tout au long de leur cycle de vie.

Les statistiques de l'OMS fournissent des données sur l'utilisation des médicaments, les dépenses pharmaceutiques et la disponibilité des médicaments essentiels.

Banque mondiale :

La Banque mondiale publie des rapports sur les dépenses de santé, incluant les dépenses spécifiques liées aux médicaments. Ces rapports offrent une vue d'ensemble des tendances et des variations des dépenses de médicaments dans différents pays.

Rapports pharmaceutiques annuels :

Les grandes sociétés pharmaceutiques publient des rapports annuels détaillant les ventes, les bénéfices, les dépenses de recherche et développement, ainsi que les nouveaux produits lancés sur le marché.

Instituts de recherche en santé :

Des instituts comme l'INSERM en France et les NIH aux États-Unis produisent des études sur les médicaments, couvrant la recherche fondamentale, les essais cliniques et les politiques de santé publique.

Publications scientifiques :

Des revues académiques telles que The Lancet et The New England Journal of Medicine publient des recherches sur l'efficacité, la sécurité, et les politiques liées aux médicaments. Ces articles sont évalués par des pairs pour garantir leur qualité et leur crédibilité.

Rapports des agences de régulation des médicaments :

Les agences comme la FDA et l'EMA publient des rapports sur l'évaluation, l'approbation et la surveillance des médicaments, incluant les processus d'évaluation, les critères d'approbation, et les mesures post-commercialisation. **[51]**

I.2-MECANISME DE TOXICITE HEPATIQUE INDUITE PAR LES MEDICAMENTS :

L'hépatotoxicité des médicaments est une préoccupation majeure pour les cliniciens, surtout avec certains médicaments qui peuvent mettre en danger la vie du patient en causant des dommages sévères au foie. Ce problème est également préoccupant pour les industries pharmaceutiques, car de tels effets secondaires peuvent conduire les autorités sanitaires à retirer du marché la molécule concernée, entraînant ainsi d'importantes pertes financières pour ces entreprises.

I.2.1-Définitions et épidémiologie

L'hépatotoxique causée par un médicament (ou Drug-Induced Liver Injury, DILI) est définie comme l'atteinte organique et/ou fonctionnelle du foie et dont le lien de causalité a été clairement établi **[1].**

L'implication majeure du foie dans le métabolisme des médicaments l'expose constamment à de fortes concentrations de molécules et/ou de leurs dérivés toxiques. Plus de 1200 médicaments sont identifiés comme étant hépatotoxiques, auxquels s'ajoutent d'autres xénobiotiques comme les produits phytothérapeutiques

Bien que les DILI soient des évènements relativement rares et dont l'incidence est estimée entre 1/10 000 à 1/100 000 selon les molécules, elles sont la première cause du retrait des médicaments par la FDA et à l'origine de 50% des insuffisances hépatiques aiguës diagnostiquées chaque année aux Etats-Unis **[52]**

En France, dans une étude prospective menée sur plus de 81 000 patients suivis pendant 3 ans, l'incidence de l'hépatotoxicité médicamenteuse était d'environ 14 cas pour 100000

habitants et parmi les 34 cas diagnostiqués dans l'étude, 12% des patients ont été hospitalisés et deux patients sont décédés des suites de leur atteinte hépatique**[53]**

I.2.2-Les différentes formes de réactions aux médicaments

Les mécanismes complexes à l'origine des hépatotoxicités induites par les médicaments (DILI) ne sont pas totalement élucidés. Deux modes d'hépatotoxicité peuvent être distingués **:**

Hépatotoxicité intrinsèque

Elle est causée par l'accumulation de métabolites toxiques tels que le NAPQI. À partir d'une dose seuil de 150 mg/kg, le NAPQI ne peut plus être pris en charge par les systèmes de régénération du glutathion saturés par la forte quantité de molécules présentes au niveau hépatocytaire

Hépatotoxicité idiosyncratique

L'hépatotoxicité idiosyncratique est imprévisible, dépend des individus et des facteurs environnementaux, et n'est pas liée à la dose. Elle représente 13 à 20% des cas de DILI, peut nécessiter une transplantation hépatique, et se manifeste après une période de latence sans signature spécifique. Souvent découverte après la commercialisation, elle peut entraîner le retrait ou la restriction d'un médicament.

Certains médicaments, comme l'acétaminophène, provoquent des lésions hépatiques de manière dose-dépendante. L'âge, le sexe, l'IMC, ainsi que l'usage simultané d'autres substances (aliments, médicaments) et des conditions physiologiques (grossesse, maladies) influencent également le métabolisme.

L'interaction entre l'éthanol et l'acétaminophène montre que l'éthanol agit comme un inducteur d'enzymes, exacerbant la toxicité hépatique de l'acétaminophène. Lorsqu'ils sont pris ensemble, ils entrent en compétition comme substrats pour le métabolisme, ce qui diminue initialement la vitesse de dégradation de l'acétaminophène et réduit la formation de son métabolite nocif. Cependant, l'éthanol prolonge l'activité de l'isoforme 2E1 du cytochrome P-450 même après son retrait, ce qui peut augmenter la formation ultérieure de métabolites toxiques. (fig. 3)




Figure I. 3 Le rôle de l'éthanol dans la formation de la N-acétyl-p-benzoquinone-imine (NAPQI), le métabolite toxique du paracétamol (APAP), et la dynamique de l'induction enzymatique. **[54]**

I.2.3-Métabolisme et toxicité hépatiques des médicaments

I.2.3.1-Anatomie et physiologie hépatiques

Le foie

Le foie, situé sous le diaphragme droit, est l'organe le plus grand du corps humain, représentant environ 2,5 % du poids total. Il est divisé en quatre lobes (droit, gauche, carré, caudé) et huit segments, chacun alimenté par une double irrigation sanguine. Environ 1,4 litre de sang le traverse chaque minute au repos, représentant 25 % du flux sanguin total.

Les lobules hépatiques, unités fonctionnelles du foie, permettent les échanges grâce à des capillaires sinusoïdaux issus de la veine porte et de l'artère hépatique. Parallèlement, un réseau de voies biliaires transporte la bile vers le canal hépatique commun, qui fusionne avec le canal cystique de la vésicule biliaire pour former le canal cholédoque, débouchant dans le duodénum pour éliminer les déchets hépatobiliaires**.**




Figure I. 4 Anatomie Hépatique **[55].**

I.2.3.2-Histologie

Le foie est principalement composé d'hépatocytes, les cellules parenchymateuses essentielles à la formation de la bile et au métabolisme de nombreuses substances. Les hépatocytes contiennent divers organites importants :

Mitochondries : Fournissent l'énergie nécessaire.

Réticulum endoplasmique rugueux : Synthétise les protéines plasmatiques.

Réticulum endoplasmique lisse : Contient des enzymes (cytochromes P450) pour le métabolisme des médicaments.

Appareil de Golgi : Sécrète les protéines dans le plasma.

Lysosomes : Contiennent des enzymes pour la destruction cellulaire.

Ribosomes libres : Synthétisent les protéines et le glycogène.

Cytosquelette : Comprend des microtubules et des filaments de myosine et intermédiaires.

♦ Lobules hépatiques

Les lobules hépatiques, unités fonctionnelles hexagonales du foie, contiennent une veine centrolobulaire et des espaces portes avec des vaisseaux de la veine porte et de l'artère hépatique, ainsi que des canaux biliaires intrahépatiques. La circulation sanguine est centripète (de l'espace porte vers la veine centrolobulaire), et la bile circule de manière centrifuge vers les espaces portes.

♦ **Cellules de Kupffer**

Les cellules de Kupffer, des macrophages situés dans les capillaires sinusoïdes de l'espace de Disse, ont une fonction de phagocytose pour empêcher certaines molécules d'atteindre la circulation générale via les veines centrolobulaires.

♦ **Autres composants**

Fibres de collagène et myofibrilles : Contrôlent le diamètre des sinusoïdes.

Cellules étoilées (cellules de Ito) : Impliquées dans le stockage de la vitamine A sous forme de vacuole lipidique.




Figure I. 5 La structure d'un lobule hépatique **[55]**

♦ **Les voies biliaires**, Les voies biliaires, regroupant les canaux intra-hépatiques et extra-hépatiques, collectent et transportent la bile des hépatocytes au duodénum. D'abord, la bile passe par les canalicules intra-lobulaires, se réunissant en canaux péri-lobulaires, puis en canaux biliaires hépatiques droit et gauche. Ces derniers forment le canal hépatique commun, qui fusionne avec le canal cystique de la vésicule biliaire pour créer le canal cholédoque.




Figure I. 6 Anatomie des voies billiaire **[56]**

I.2.4-l'élimination hépatiques des xénobiotiques

La polarisation, la composition et la fonction des membranes hépatiques jouent un rôle essentiel dans l'absorption, le métabolisme et l'élimination de substances étrangères telles que les médicaments, qui sont éliminés en tant qu'inactives ou bioactives dans les pro-drogues (10%). Le début de ces phases est le transport des molécules dans le foie (phase 0), suivi de deux phases métaboliques avec des enzyme spécifiques (phase I, fonctionnalisation et phase II, conjugation). La phase III consiste à éliminer l'heparin hydrosoluble de la cellule.




Figure I. 7 Représentation schématique du métabolisme hépatocytaire des médicaments **[57]**

I.2.5-Mécanismes de l'hépatotoxicité médicamenteuse

Les mécanismes soutenant les DILI ne sont pas encore tout à fait connus du fait d'un manque de données appuyées par des modèles in vitro et in vivo.. Il a été démontré en effet que la sévérité des DILI était associée à un coefficient de partage octanol/eau (ou logP) supérieur ou égal à 3 et une dose journalière supérieure à 100 mg La nature multifactorielle de ces lésions résulte de l'interaction de multiples mécanismes de réponse cellulaire et moléculaire, ajoutés aux facteurs environnementaux et impliquant les caractéristiques de l'hôte (Figure 8)




Figure I. 8 Mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans les DILI idiosyncratiques, d'après Villanueva-Paz et al **[58]**

I.2.4.1-Formation de métabolites réactifs

Les médicaments sont métabolisés principalement dans le foie, où ils subissent une biotransformation par le cytochrome P450 et une conjugaison avec des molécules endogènes (acide glucuronique, sulfate, etc.). Ce processus vise à rendre les médicaments plus solubles en phase aqueuse, facilitant leur élimination par voie urinaire et biliaire. Cependant, cette transformation peut parfois générer des métabolites réactifs (Fig. 9).

♦ Un métabolite réactif réagit rapidement avec des molécules cellulaires environnantes telles que le glutathion, certaines protéines ou des acides nucléiques. (Fig. 9).

♦ L'accumulation de métabolites réactifs, comme dans le cas du paracétamol, induit un stress au niveau du réticulum endoplasmique à cause de l'accumulation d'espèces radicalaires

intracellulaires. Cela perturbe l'homéostasie calcique et altère le mécanisme de réponse aux protéines mal conformées (UPR).

♦ La fixation des métabolites réactifs aux protéines peut créer des néoantigènes, tandis que leur attaque de l'ADN peut provoquer des lésions génomiques, ayant des effets délétères sur la vie cellulaire.

♦ Les hépatocytes possèdent des enzymes, telles que les glutathion S-transférases (GST) et le NADPH, pour transformer les métabolites réactifs en molécules moins nocives.




Figure I. 9 Conséquences physiopathologiques de la génération d'un métabolite réactif au niveau des hépatocyte **[59]**

La formation en grande quantité de métabolites réactifs entraîne des conséquences délétères pour les cellules. Un premier effet direct est la fixation covalente de ces métabolites à l'ADN, provoquant des altérations génétiques. Ces altérations peuvent activer la protéine p53, qui dirige la cellule vers la mort cellulaire par la voie mitochondriale (Fig. 10) .

Un second effet indirect majeur est l'induction d'un stress oxydatif (Fig. 9). La fixation massive des métabolites réactifs au glutathion réduit les stocks de cette molécule antioxydante essentielle. Le glutathion joue un rôle crucial dans la détoxication des espèces réactives de l'oxygène (ERO) et des xénobiotiques.

Les ERO et les produits de la peroxydation lipidique peuvent endommager les mitochondries en perturbant la perméabilité de leurs membranes. Ces altérations structurales et fonctionnelles des mitochondries peuvent conduire à la mort cellulaire. Le stress oxydatif

résultant de la diminution des niveaux de glutathion provoque également une augmentation du calcium intracellulaire, aggravant les dommages mitochondriaux et contribuant à la cytotoxicité (Fig. 9) **[59]**




Figure I. 10 Toxicité mitochondriale des médicaments, et conséquences métaboliques de cette toxicité **[59]**

I.2.4.2-Dysfonctionnement mitochondrial

De nombreux médicaments peuvent altérer les fonctions des mitochondries (Tableau 1), provoquant différents types de lésions hépatiques, telles que des hépatites cytolytiques, des stéatoses et des stéatohépatites .



Acide salicylique (métabolite de l'aspirine) : inhibition de l'oxydation des acides gras, ouverture du PTPM
Acide valproïque (anticonvulsivant) : inhibition de l'oxydation des acides gras, ouverture du PTPM
Alpidem [a] (anxiolytique) : ouverture du PTPM
Amiodarone (antiarythmique) : inhibition de l'oxydation des acides gras, altérations de la phosphorylation oxydative
Diclofénac (anti-inflammatoire non stéroïdien) : ouverture du PTPM
Didanosine (antirétroviral) : déplétion de l'ADNmt
Fialuridine [a] (antiviral) : déplétion de l'ADNmt
Ibuprofène (anti-inflammatoire non stéroïdien) : inhibition de l'oxydation des acides gras
NAPQI (métabolite du paracétamol) : ouverture du PTPM
Nimésulide (anti-inflammatoire non stéroïdien) : ouverture du PTPM
Panadiplon [a] (anxiolytique) : inhibition de l'oxydation des acides gras
Perhexiline [a] (antiangoreux) : inhibition de l'oxydation des acides gras, altérations de la phosphorylation oxydative
Stavudine (antirétroviral) : déplétion de l'ADNmt
Tacrine [a] (inhibiteur de l'acétylcholinestérase) : déplétion de l'ADNmt, altérations de la phosphorylation oxydative
Tamoxifène (anticancéreux) : inhibition de l'oxydation des acides gras, altérations de la phosphorylation oxydative
Troglitazone [a] (antidiabétique oral) : ouverture du PTPM

Tableau 1-4-2 médicaments altérer les fonctions des mitochondries **[59]**

A-La stéatose

La stéatose hépatique est une condition caractérisée par l'accumulation de graisse dans le cytoplasme des hépatocytes. Elle peut se manifester sous deux formes principales.

La stéatose microvésiculaire : se distingue par l'accumulation de petites inclusions lipidiques intracellulaires, généralement causée par un dysfonctionnement mitochondrial inhibant l'oxydation des acides gras, ce qui peut entraîner une cytolyse hépatique, et potentiellement une insuffisance hépatique et rénale

La stéatose macrovésiculaire : est caractérisée par de grandes inclusions lipidiques, souvent due à une inhibition modérée de la bêta-oxydation, une diminution de la sécrétion des VLDL ou une activation de la lipogenèse. Bien que les lésions soient bénignes à court terme

B-Ouverture du pore de transition de perméabilité mitochondriale

Les membranes mitochondriales contiennent plusieurs protéines formant un "pore" qui reste fermé dans des conditions physiologiques normales. Les principales protéines de ce "pore de transition de perméabilité mitochondriale" (PTPM) sont le voltage-dependent anion channel (VDAC), l'adenine nucleotide translocase (ANT) et la cyclophyline D. Certains médicaments, comme le diclofénac, l'acide valproïque, peuvent provoquer l'ouverture du PTPM La

troglitazone, le NAPQI (métabolite réactif du paracétamol) peuvent également induire cette ouverture .

Les conséquences de l'ouverture du PTPM sont potentiellement graves et peut entraîner la mort des hépatocytes par nécrose ou apoptose.

I.2.4.3-Altérations du Métabolisme Hépatique des Lipides

L'inhibition de l'oxydation mitochondriale des acides gras entraîne une accumulation de triglycérides dans le foie, illustrée par la **Figure 10** et discutée dans le Tableau 1

Certains médicaments perturbent les voies métaboliques extra-mitochondriales, ce qui augmente les niveaux de lipides intrahépatiques. Par exemple, le pirprofène inhibe l'enzyme MTP, réduisant ainsi la sortie hépatique des VLDL et affectant l'association des triglycérides avec l'apolipoprotéine B, comme représenté dans les **Figures 10 et 11** .

Certains médicaments stimulent la synthèse des acides gras en activant des facteurs de transcription régulant l'expression des enzymes impliquées dans la lipogenèse. Les thiazolidinediones, comme la troglitazone, activent le facteur de transcription PPARγ, augmentant ainsi la synthèse des acides gras, comme indiqué dans la **Figure 11 [61]**.




Figure I. 11 Mécanismes d'altération du métabolisme des lipides par les médicaments et conséquences physiopathologiques **[59]**

I.2.4.4-Inhibition du transporteur d'acides biliaires BSEP

Le transporteur BSEP est essentiel pour éliminer les composés toxiques endogènes et les xénobiotiques. .Cela provoque une accumulation de sels biliaires toxiques pour les mitochondries, augmentant le stress intracellulaire et déclenchant une cascade pro-apoptotique.

Cependant, la perte de fonction de BSEP seule ne suffit pas à expliquer les lésions hépatiques induites par les médicaments (DILI).




Figure I. 12 Transporteurs membranaires de l'hépatocyte **[62]**

Lorsque la cholestase prédomine, il y a une atteinte des composants sécrétoires de la bile, soit au niveau de la membrane canaliculaire, soit au-delà (Figure 3C). La jaunisse et le prurit associés peuvent être sévères, avec une perte permanente des canaux biliaires (Figure 3D)




Figure I. 13 Caractéristiques Histologiques de la Lésion Hépatique Induite par les Médicaments **[54]**

Panel A montre une vue en haute puissance d'un foie normal incluant un tractus portal et des sinusoïdes hépatiques environnants.Aucune veine hépatique n'est montrée (hématoxyline et éosine, ×240).

Panel B montre les effets hépatotoxiques du troglitazone chez une femme de 54 ans atteinte de diabète. Cette vue midzonale montre une dégénérescence ballonisante des hépatocytes avec désordre lobulaire (hématoxyline et éosine, ×320).

Panel C montre une lésion cholestatique due au triméthoprime-sulfaméthoxazole chez une femme de 42 ans. Ce tractus portal montre un canal biliaire sévèrement endommagé entouré de lymphocytes et d'éosinophiles. Le pourcentage d'éosinophiles dans le sang périphérique a atteint 42 % (hématoxyline et éosine, ×320).

Panel D montre un spécimen de biopsie de suivi de la même patiente huit mois plus tard, démontrant la disparition des canaux biliaires (syndrome des canaux biliaires disparus). Ce tractus portal montre une artère et une veine normales sans canal biliaire restant visible (trichrome de Masson, ×360).

Panel E montre les résultats d'un surdosage accidentel de paracétamol chez une femme de 34 ans, incluant une nécrose sévère centrilobulaire et midzonale avec épargne des tractus portaux et des hépatocytes périportaux (acide périodique de Schiff avec diastase, ×60).

Panel F montre les effets toxiques chez un homme de 34 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine, admis avec une acidose lactique sévère et un choc trois semaines après avoir commencé le didanosine. Il y a une accumulation frappante de petites vésicules lipidiques dans les cellules, ainsi qu'un infiltrat inflammatoire modéré, principalement des lymphocytes et des plasmocytes (hématoxyline et éosine, ×360).

I.2.4.5-Les hépatites immunoallergiques

Les hépatites médicamenteuses immunoallergiques ou auto-immunes impliquent principalement l'immunité spécifique, où les anticorps des lymphocytes B reconnaissent les antigènes. Après le métabolisme hépatique, les métabolites réactifs peuvent alkyler des protéines intracellulaires, qui sont ensuite libérées lors du renouvellement cellulaire. Dans une réponse de type cellulaire (Figure 13), ces protéines sont phagocytées par les cellules de Kupffer, dégradées en peptides, puis associées à des molécules de classe II du CMH et exprimées à la

surface des macrophages. Ces complexes sont reconnus par les récepteurs des lymphocytes Th1, activant ainsi ces derniers. Cela entraîne la sécrétion de cytokines, qui activent les lymphocytes T cytotoxiques, les macrophages et les cellules NK, **[63]**




Figure I. 14 Mécanisme de la cytotoxicité a médiation cellulaire **[64]**

Lors de l'immunité humorale (**Figure 14)**, certains lymphocytes B reconnaissent les adduits protéiques libérés lors de la dégénérescence des hépatocytes. Ces protéines sont internalisées et présentées à la surface des lymphocytes B en association avec des molécules de classe II. Les lymphocytes Th2 reconnaissent ce complexe et induisent la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Les plasmocytes sécrètent des anticorps anti-protéines alkylées qui se lient aux adduits à la surface des hépatocytes. Les cellules NK et les macrophages, via leurs récepteurs Fc, reconnaissent ces complexes et détruisent les hépatocytes. Le complément est également activé, contribuant à la nécrose cellulaire **[64]**




Figure I. 15 Mécanisme de la cytotoxicité a médiation humorale **[64]**

I.2.4.6-Activation de la réponse immunitaire

La destruction des hépatocytes libère des DAMPs (danger-associated molecular patterns) comme HMGB1 (high mobility group box 1) et les protéines HSP (heat shock protein). Ces molécules activent la réponse immunitaire innée via les récepteurs Toll-like (TLR) sur les cellules immunitaires (macrophages, lymphocytes, polynucléaires, cellules dendritiques) Cela entraîne la sécrétion de cytokines telles que TNF-α (Tumor Necrosis Factor), FasL (Fas ligand), et TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand présent sur les lymphocytes NK, Natural Killer et les neutrophiles), qui activent les voies de mort cellulaire (apoptose, nécrose), provoquant une réponse inflammatoire exacerbée. **[65]**

La formation de complexes entre les métabolites réactifs et des protéines, agissant comme des néo-antigènes et activant les cellules présentatrices d'antigènes (CPA) .

La reconnaissance des molécules de danger (DAMPs) par les CPA, entraînant l'activation des lymphocytes T CD8+ et CD4+ **[66].**




Figure I. 16 Les mécanismes de lésions hépatiques **[54]**

I.3- ALGORITHME GENETIQUE (GA)

I.3.1-Explication d'algorithme génétique

Les AG sont une classe d'algorithmes d'optimisation inspirés par la sélection naturelle et l'évolution biologique. Développés par John Holland dans les années 1960, ils sont utilisés pour résoudre des problèmes d'optimisation complexes dans divers domaines tels que l'ingénierie, la science des données, la bioinformatique, et la finance. Contrairement aux méthodes traditionnelles, les AG utilisent une approche probabiliste pour explorer l'espace des solutions, trouvant des solutions acceptables en un temps raisonnable **[67].**

I.3.2-Algorithme Génétique (GA) pour le Développement de Modèles QSAR

Une méthode heuristique de recherche appelée algorithme génétique (GA) imite le processus de sélection naturelle. Quand il est impossible de mener une recherche exhaustive, on utilise des méthodes heuristiques afin de ralentir le processus de recherche d'une solution satisfaisante. Les algorithmes génétiques font partie de la plus grande catégorie des algorithmes évolutifs (EA), qui proposent des solutions à des problèmes d'optimisation en utilisant des

méthodes inspirées de l'évolution naturelle, comme l'héritage, le croisement, la mutation et la sélection. **[67]**

- **Le fondement théorique et l'algorithme**

Les algorithmes génétiques (AG) sont inspirés par le processus de sélection naturelle et sont utilisés pour résoudre des problèmes complexes d'optimisation et de recherche. Ils font partie de la classe des algorithmes évolutionnistes (AE) et génèrent des solutions en utilisant des mécanismes tels que l'héritage, le croisement, la mutation et la sélection.

♦ **Initialisation de l'algorithme génétique**

L'initialisation d'un AG commence par la génération aléatoire de nombreuses solutions individuelles pour former une population initiale. Cela permet de couvrir toute la gamme des solutions possibles. Parfois, les solutions peuvent être "ensemencées" dans des zones où il est probable que des solutions optimales soient trouvées.

♦ **Sélection**

Au cours de chaque génération successive, une proportion de la population existante est sélectionnée pour engendrer une nouvelle génération. La sélection est basée sur une fonction de fitness qui évalue chaque individu. Les meilleurs individus.

♦ Dans l'outil Algorithme génétique v4.0, la fonction de fitness est basée sur des métriques d'erreur de prédiction, telles que l'erreur absolue moyenne (MAE) et MAE + 3 × σ_AE, qui ont été récemment proposées dans la littérature. **[68]**

_σ AE _correspond à la déviation standard des valeurs d'erreur absolue (AE).

La fonction de fitness [69]

$$F = \sum_{i=0}^{i=k} \frac{\hat{P}_{i,Threshold} - P_i}{\hat{P}_{i,Threshold} - \hat{P}_{i,Ideal}} \quad \text{... (1)}$$

F = Score de fitness,

K = Nombre de paramètres (ici, k=2)

Pi = Valeur du paramètre respectif pour une équation

Les métriques impliquées dans cette fonction de fitness ainsi que leurs valeurs idéales et seuils sont présentées dans le Tableau 2. Ici, un score de fitness plus élevé indique une meilleure adéquation du modèle QSAR en termes de qualité de prédiction réelle.

Tableau I. 1 Les paramètres ainsi que leurs valeurs idéales et seuils utilisés dans la fonction de fitness de l'outil d'algorithme génétique interne

Parameter	Ideal value	Threshold value
MAE	0.0	$0.15 \times TrainYObsRange^*$
$MAE + 3 \times \sigma_{AE}$	0.0	$0.25 \times TrainYObsRange$

*TrainYObsRange = Range of training set observed response values

Outils d'algorithmes génétiques

Les outils d'AG sont utilisés pour la sélection de variables significatives (descripteurs). Il existe deux outils principaux :

Algorithme Génétique (Entraînement) v4.1 : Cet outil développe un modèle à partir des informations de l'ensemble d'entraînement et évalue la qualité de prédiction via divers paramètres de validation.

Algorithme Génétique (Entraînement-Test) v4.1 : En plus de développer un modèle à partir de l'ensemble d'entraînement, cet outil calcule les paramètres de validation pour les ensembles d'entraînement et de test.

La fonction de fitness (score de fitness) utilisée pour sélectionner les meilleures solutions est proportionnelle à la qualité du modèle QSAR. Le modèle QSAR avec le score de fitness le plus élevé est sélectionné comme le meilleur. Les paramètres de validation tels que

R2, R2R^2R2 ajusté, SEE, Q2Q^2Q2 (LOO), SDEP, métriques Rm2R_m^2Rm2

la qualité de prédiction basée sur MAE sont également calculés et analysés pour juger de la robustesse du modèle QSAR. Le dossier de l'outil Algorithme Génétique (AG) est structuré en trois sous-dossiers : Data, Lib et Output**. [68, 70]**

- **Structure des dossiers**

Data : Le dossier est conçu pour héberger les fichiers d'entrée, offrant à l'utilisateur un moyen pratique de centraliser tous les fichiers nécessaires. En cliquant sur "parcourir", le dossier Data est automatiquement ouvert, simplifiant ainsi la sélection et la gestion des fichiers d'entrée.

Lib : Ce dossier contient les fichiers de bibliothèque nécessaires à l'exécution du programme. Il est crucial de ne pas déplacer, supprimer ou renommer ces fichiers pour éviter tout dysfonctionnement du programme.

Output : Le dossier "Output" est spécifiquement dédié à l'enregistrement des fichiers de sortie produits par l'outil d'Algorithmes Génétiques (AG). Similaire au dossier "Data", lorsque l'utilisateur sélectionne le bouton "parcourir" pour sauvegarder un fichier, ce dossier est ouvert par défaut. Cette organisation vise à faciliter la gestion des fichiers d'entrée et de sortie tout en assurant l'intégrité des bibliothèques nécessaires pour le bon fonctionnement de l'outil AG.**[68]**

I.3.3-Introduction aux algorithmes génétiques et leur potentiel dans la prédiction de la toxicité

Les algorithmes génétiques (AG) sont des outils puissants dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, et ils montrent un grand potentiel pour prédire la toxicité des composés chimiques notamment la toxicité hépatique, est une préoccupation majeure dans le développement de médicaments. Les AG offrent un moyen efficace de modéliser et de prédire la toxicité de nouveaux composés, grâce à leur capacité à gérer des données complexes et non linéaires. **[67]**

- **Principe des Algorithmes Génétiques**

Les algorithmes génétiques s'inspirent du processus de sélection naturelle. Ils utilisent des opérations telles que la mutation, le croisement (crossover), et la sélection pour optimiser une population de solutions potentielles par rapport à une fonction objectif

- **Les étapes de base d'un algorithme génétique** :

Initialisation : Génération aléatoire d'une population initiale de solutions.

Évaluation : Calcul de la fitness (aptitude) de chaque individu dans la population en utilisant une fonction d'évaluation.

Sélection : Choix des individus les plus aptes pour se reproduire.

Croisement : Combinaison de paires d'individus sélectionnés pour produire une nouvelle génération.

Mutation : Modification aléatoire de certains individus pour introduire de la diversité.

Répétition : Répétition des étapes d'évaluation, de sélection, de croisement et de mutation jusqu'à convergence vers une solution optimale.

Avantages des Algorithmes Génétiques pour la Prédiction de la Toxicité

- Gestion de la Complexité et de la Non-linéarité :
- Adaptabilité et Flexibilité :
- Optimisation Multi-objectif **:**

Application des Algorithmes Génétiques à la Prédiction de la Toxicité Hépatique

La toxicité hépatique est une préoccupation majeure dans le développement de médicaments, car le foie est l'organe principal de la métabolisation des médicaments. Voici comment les AG peuvent être appliqués pour prédire la toxicité hépatique :

- Sélection des Descripteurs :
- Optimisation des Modèles Prédictifs :
- Création de Modèles Hybrides **:**

Études et Réalisations

Plusieurs études ont démontré l'efficacité des AG dans la prédiction de la toxicité :

Étude 1 : Une étude a utilisé des AG pour sélectionner des descripteurs moléculaires et optimiser les paramètres d'un modèle de machine à vecteurs de support, obtenant une précision élevée dans la prédiction de la toxicité hépatique.

Étude 2 : Une autre étude a combiné des AG avec des réseaux de neurones artificiels pour prédire la toxicité de nouveaux composés chimiques, montrant une amélioration significative par rapport aux méthodes traditionnelles.

♦ Les algorithmes génétiques offrent un potentiel considérable pour la prédiction de la toxicité hépatique des composés chimiques. Leur capacité à gérer des données complexes et non linéaires, ainsi que leur adaptabilité, en font des outils précieux dans le développement de médicaments. En utilisant des AG pour optimiser les modèles prédictifs et sélectionner les descripteurs les plus pertinents, les chercheurs peuvent améliorer la précision et la fiabilité des prédictions de toxicité, contribuant ainsi à la sécurité et à l'efficacité des nouveaux médicaments **[71]**

I.3.4-État de l'art sur les méthodes de prédiction de la toxicité hépatique

Les méthodes de prédiction de la toxicité hépatique sont essentielles pour évaluer les risques potentiels des nouveaux médicaments et produits chimiques sur le foie, l'un des organes les plus critiques du corps humain.

Approches In Vitro :

Les cultures cellulaires hépatiques sont largement utilisées pour évaluer la toxicité hépatique. Elles impliquent l'exposition de cellules hépatiques humaines ou animales à des substances chimiques pour mesurer des paramètres tels que la viabilité cellulaire, la mort cellulaire, et la production de métabolites. [. [72]

Modèles Animaux :

Les rats et les souris sont des modèles animaux couramment utilisés pour étudier la toxicité hépatique. Ces modèles permettent d'évaluer les effets des substances chimiques sur la structure et la fonction hépatiques par diverses voies d'administration **[73]**

Approches in silico :

Méthodes in silico de modélisation informatique

Les méthodes in silico utilisent des techniques de modélisation informatique pour prédire la toxicité hépatique en simulant des interactions moléculaires entre les substances chimiques et les protéines hépatiques, ainsi que les voies métaboliques conduisant à la toxicité.. **[k]**

Exemple : Une étude récente a utilisé des simulations informatiques pour prédire l'interaction entre un composé chimique et une protéine hépatique spécifique, identifiant ainsi les sites potentiels de liaison et évaluant le risque de toxicité hépatique associé à ce composé.

♦ **Approches de QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship)** : Les approches QSAR établissent des relations quantitatives entre la structure chimique des composés et leur activité biologique, y compris leur toxicité hépatique.

Exemple : Une étude QSAR a développé un modèle prédictif basé sur la structure chimique de divers composés pour évaluer leur potentiel de toxicité hépatique. Ce modèle a été validé avec succès en prédisant la toxicité hépatique de nouveaux composés avec une précision élevée. **[74]**

Biologie des systèmes et approches omiques :

Les technologies omiques, telles que la génomique, la transcriptomique, la protéomique et la métabolomique, sont de plus en plus utilisées pour comprendre les mécanismes sous-jacents de la toxicité hépatique.

Les approches de biologie des systèmes intègrent ces données omiques pour reconstruire des réseaux de régulation biologique et identifier les voies de signalisation perturbées par les substances chimiques toxiques.

Technologies omiques pour comprendre la toxicité hépatique : Les technologies omiques, telles que la génomique, la transcriptomique, la protéomique et la métabolomique, offrent une vue d'ensemble des altérations moléculaires induites par les substances chimiques toxiques dans le foie. La génomique étudie le génome, la transcriptomique analyse les niveaux d'expression des gènes, la protéomique examine les protéines présentes, et la métabolomique évalue les métabolites dans les cellules ou les tissus hépatiques **[75]**

♦ **Approches de biologie des systèmes pour identifier les voies de signalisation perturbées** : Les approches de biologie des systèmes intègrent les données omiques pour reconstruire des réseaux de régulation biologique, tels que les réseaux de gènes ou de protéines, et identifier les voies de signalisation perturbées par les substances chimiques toxiques. Ces analyses permettent de comprendre les mécanismes sous-jacents de la toxicité hépatique et de prédire les effets des substances chimiques sur la fonction hépatique.**[76]**

♦ **Utilisation de l'intelligence artificielle :**

L'intelligence artificielle, y compris les réseaux de neurones profonds et l'apprentissage automatique, est de plus en plus utilisée pour prédire la toxicité hépatique à partir de données expérimentales et omiques. Ces techniques permettent une analyse sophistiquée des données complexes et une modélisation précise des interactions entre les composés chimiques et le foie.

♦ **Amélioration de la précision des prédictions de toxicité :** Ces modèles d'IA peuvent identifier des motifs complexes dans les données qui ne seraient pas facilement détectés par d'autres méthodes, améliorant ainsi la précision des prédictions de toxicité. En intégrant une grande quantité de données hétérogènes, y compris des données expérimentales et omiques, les modèles d'IA peuvent capturer les interactions subtiles entre les composés chimiques et le foie, permettant une prédiction plus précise de la toxicité. **[77]**

I.3.5-Des études menées par des chercheurs sur la prédiction de la toxicité hépatique des médicaments

Développement de modèles prédictifs :

Des chercheurs ont développé des modèles prédictifs de toxicité hépatique en utilisant des ensembles de données intégrant des techniques d'apprentissage automatique et de réseaux de

neurones profonds. Ces modèles intègrent des données omiques (transcriptomique, protéomique, métabolomique) pour identifier des biomarqueurs prédictifs de la toxicité hépatique des médicaments. **[78]**

Évaluation in vitro de la toxicité hépatique :

Les chercheurs utilisent des modèles cellulaires hépatiques, notamment des cultures de cellules hépatiques primaires et des lignées cellulaires dérivées de cellules souches, pour évaluer la toxicité hépatique des médicaments in vitro. Ils mesurent des marqueurs tels que la cytotoxicité, le stress oxydatif et le dysfonctionnement mitochondrial pour comprendre les effets des médicaments sur les cellules hépatiques. **[79]**

Analyse rétrospective des données cliniques :

Les chercheurs analysent les bases de données cliniques pour identifier précocement les signes de toxicité hépatique liée à l'utilisation de médicaments. À l'aide de méthodes statistiques et d'algorithmes d'apprentissage automatique, ils identifient les facteurs de risque de lésions hépatiques et développent des outils de prédiction pour les patients sous traitement médicamenteux.**[80]**

I.3.6-Rôle des données dans la prédiction de la toxicité hépatique

Les données jouent un rôle crucial dans la prédiction de la toxicité hépatique.

1. Collection de Données

a-Données Précliniques

Études in vitro : Utilisation de cellules hépatiques pour observer les effets toxiques des composés chimiques.

Modèles animaux : Les études sur des modèles animaux permettent de recueillir des informations sur les effets hépatiques de nouveaux médicaments ou substances chimiques. .

L'utilisation de modèles animaux dans les études de toxicité hépatique est cruciale pour comprendre les mécanismes d'action des substances chimiques et des médicaments. Ces modèles permettent d'observer les effets physiopathologiques et biochimiques des composés, fournissant des informations essentielles qui ne peuvent pas toujours être obtenues par des études in vitro. **[81] .**

b. Données Cliniques

Essais cliniques : Collecte de données chez l'homme pour évaluer la toxicité hépatique potentielle des nouveaux traitements

Les essais cliniques constituent une étape indispensable pour évaluer la toxicité hépatique potentielle des nouveaux traitements chez l'homme. Ces essais permettent de collecter des données cliniques détaillées et d'identifier les biomarqueurs sériques pertinents pour la détection précoce des effets hépatotoxiques. Les informations recueillies à ce stade sont essentielles pour garantir la sécurité des patients et pour ajuster les doses de médicaments en fonction des réponses individuelles.

Pharmacovigilance : Surveillance des effets secondaires après la commercialisation des médicaments.

La pharmacovigilance est cruciale pour surveiller et évaluer les effets secondaires des médicaments après leur commercialisation. Cette surveillance continue permet de détecter les réactions hépatotoxiques rares ou tardives qui n'ont pas été identifiées lors des essais cliniques. Les systèmes de pharmacovigilance collectent et analysent les données sur les événements indésirables signalés par les professionnels de santé et les patients, contribuant ainsi à une meilleure gestion des risques et à la sécurité des médicaments sur le marché. **[82]**

2. Analyse de Données

a- Bioinformatique

Omics Data : Données génomiques, protéomiques et métabolomiques pour comprendre les mécanismes sous-jacents de la toxicité hépatique.

Les données omiques jouent un rôle essentiel dans l'analyse de la toxicité hépatique. Les technologies génomiques, protéomiques et métabolomiques permettent de décortiquer les mécanismes moléculaires sous-jacents aux effets toxiques, offrant une vue d'ensemble des interactions complexes entre les composés chimiques et les systèmes biologiques. Ces approches omiques sont particulièrement utiles pour identifier les voies métaboliques affectées et les cibles potentielles de toxicité. .

Modélisation et Simulation : Utilisation de modèles mathématiques et informatiques pour prédire la toxicité sur la base des données disponibles.

a- Modélisation mathématique :

Concept : Les modèles mathématiques, tels que les équations différentielles, sont utilisés pour décrire les processus dynamiques dans le foie.

Application : Ils permettent de prédire les concentrations de médicaments et de leurs métabolites dans le foie au fil du temps, ainsi que les effets potentiels de ces concentrations sur la fonction hépatique. .

b- Simulation informatique :

Concept : Les simulations informatiques utilisent des logiciels spécialisés pour modéliser les interactions biologiques à différents niveaux d'organisation, des molécules aux systèmes d'organes.

Application : Ces simulations peuvent aider à identifier les cibles moléculaires de la toxicité et à comprendre les mécanismes d'action des substances chimiques, contribuant ainsi à la prédiction et à la prévention des effets toxiques. .

c- Approches de modélisation physiologique :

Concept : Les modèles physiologiques basés sur la physiologie humaine, comme les modèles PBPK (Physiologically Based Pharmacokinetic), intègrent des données sur l'anatomie, la physiologie et la biochimie du foie pour simuler la distribution et les effets des substances chimiques dans le corps humain.

Application : Ces modèles sont particulièrement utiles pour extrapoler les données des études animales aux humains et pour prédire la variabilité individuelle dans les réponses aux médicaments. .

d- Intégration des données multi-échelles :

Concept : Les approches de modélisation multi-échelles intègrent des données à différentes échelles biologiques (moléculaire, cellulaire, tissulaire et organique) pour fournir une vue holistique des effets toxiques.

Application : Ces modèles permettent de relier les effets observés à l'échelle moléculaire**[83]**

b- Apprentissage Automatique

Algorithmes de Machine Learning : Utilisation d'algorithmes pour analyser de grandes quantités de données et identifier des modèles associés à la toxicité hépatique.

Les algorithmes de machine learning (apprentissage automatique) jouent un rôle crucial dans l'analyse de vastes ensembles de données pour prédire la toxicité hépatique. Ces techniques permettent d'identifier des schémas complexes et des relations non évidentes entre les variables.

Collecte et Prétraitement des Données :

Concept : Le processus commence par la collecte de grandes quantités de données provenant de différentes sources, telles que les essais cliniques, les bases de données de pharmacovigilance, les études in vitro et in vivo, et les données omiques.

Application : Le prétraitement des données inclut des étapes telles que la normalisation, la mise à l'échelle, la transformation et la sélection de caractéristiques pertinentes pour la modélisation. **[84]**

Sélection et Formation des Modèles :

Concept : Divers algorithmes de machine learning sont utilisés pour créer des modèles prédictifs.

Application : Ces modèles sont formés sur des ensembles de données d'entraînement, où l'algorithme apprend à partir des caractéristiques d'entrée et des étiquettes de sortie pour prédire la toxicité hépatique. .

Évaluation et Validation des Modèles :

Concept : Après la formation, les modèles doivent être évalués et validés pour s'assurer de leur précision et de leur capacité de généralisation.

Application : La validation permet de détecter le surajustement et d'optimiser les hyperparamètres pour améliorer les performances du modèle

Interprétation et Visualisation des Modèles :

Concept : Les modèles de machine learning peuvent être complexes et difficiles à interpréter.

Application : L'interprétation des modèles aide les chercheurs à identifier les biomarqueurs et les mécanismes sous-jacents de la toxicité hépatique, ainsi qu'à fournir des informations exploitables pour le développement de médicaments.

Applications Pratiques et Avantages :

Concept : Les modèles de machine learning peuvent être utilisés pour cribler des bibliothèques de composés chimiques, prédire la toxicité des nouvelles molécules avant les essais cliniques, et personnaliser les traitements pour minimiser les risques de toxicité hépatique chez les patients.

Application : Ces approches permettent de réduire les coûts et le temps de développement des médicaments, d'améliorer la sécurité des patients et de fournir des alternatives plus éthiques aux tests sur les animaux.

Deep Learning : Approches avancées comme les réseaux de neurones pour prédire la toxicité en se basant sur des données complexes et volumineuses.

3. Intégration de Données

Bases de Données : Compilation des données de différentes sources pour une analyse plus complète. .

Big Data : Techniques de traitement des grandes quantités de données pour extraire des informations pertinentes. .

4. Validation et Vérification

Études de Validation : Tests supplémentaires pour vérifier les prédictions de toxicité. .

Approches Translationales : Passage des découvertes en laboratoire à des applications cliniques.

5. Utilisation dans le Développement de Médicaments

Optimisation des Composés : Utilisation des données pour modifier les composés chimiques et réduire leur toxicité hépatique.

Sélection de Candidats Médicamenteux : Identification des candidats prometteurs avec un profil de toxicité hépatique acceptable.

6. Réglementation et Conformité

Soumissions Réglementaires : Présentation des données de toxicité aux autorités réglementaires pour l'approbation des nouveaux médicaments.

Directives et Normes : Conformité aux directives établies par des organismes comme la FDA (Food and Drug Administration) ou l'EMA (European Medicines Agency). **[85]**

II-MATERIAL ET METHODE

II- MATERIAL ET METHODE

II.1-COLLECTE ET PRETRAITEMENT DES DONNEES SUR LA TOXICITE HEPATIQUE DES MEDICAMENTS

Pour former une base sur la toxicité hépatique des médicaments, nous avons collecté des données à partir de diverses sources de données publiques et génomiques :

Les bases de données les plus utilisées sont :

II.1.1-Bases de données publiques :

PubMed : Nous avons extrait des articles de recherche et des études cliniques traitant de la toxicité hépatique des médicaments en utilisant des mots-clés tels que "toxicité hépatique", "effets indésirables des médicaments" et "hépatotoxicité".

DrugBank : Cette base de données nous a fourni des informations détaillées sur les médicaments, y compris leurs structures chimiques, mécanismes d'action, métabolites, et profils de toxicité.

II.1.2-Types de Données

Les types de données collectées incluent deux aspects :

Données pharmacologiques : Nom du médicament, classe thérapeutique, posologie, métabolites, mécanisme d'action.

Données cliniques : Incidents de toxicité hépatique, niveaux de toxicité hépatiques symptômes cliniques rapportés.

III.1.3-Prétraitement des Données

Nettoyage des Données

Les données collectées ont été soumises à plusieurs étapes de nettoyage pour garantir une base de données de qualité et de pertinence :

Suppression des doublons : Les enregistrements redondants ont été éliminés pour éviter les biais dans les analyses ultérieures.

Gestion des valeurs manquantes :

Imputation : Les valeurs manquantes ont été eliminées ou remplacées par des estimations basées sur des moyennes.

Suppression : Les enregistrements ou variables avec un grand nombre de valeurs non signeficatives ont été retirés de la base.

Normalisation et standardisation : les differentes valeurs de toxcité, ont été normalisées pour tout les categories de medicaments pour les rendre comparables entre différents enregistrements.

II.2. GENERATION DES DESCRIPTEURS MOLECULAIRES.

II.2.1-Introduction des SMILES

Pour chaque molécule de médicament, la représentation SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry System) a été collectée à partir de bases de données comme DrugBank. Cette représentation permet une description précise et succincte de la structure moléculaire.

II.2.2-Utilisation du Logiciel PaDEL

Les SMILES obtenus ont été introduits dans le logiciel **PaDEL** (PaDEL-Descriptor) pour générer les descripteurs moléculaires. Ces descripteurs sont essentiels pour l'analyse algorithmique de la toxicité hépatique et nous avons travailés sur deux types de descripteurs.

- **Descripteurs 2D** : Ils incluent des informations telles que :

-Descripteurs topologiques

-Descripteurs basés sur les fragments moléculaires

-Indices de connectivité

-Comptages de sous-structures spécifiques

- **Descripteurs 3D** : Ils fournissent des informations tridimensionnelles sur la structure moléculaire, incluant :

-Descripteurs géométriques

-Descripteurs basés sur les conformations

-Propriétés électrostatiques

-Descripteurs de surface et de volume moléculaires

II.2.3-Association des Descripteurs aux Degrés de Toxicité

Chaque molécule de médicament, représentée par ses descripteurs moléculaires 2D et 3D, a été associée à son degré de toxicité hépatique.

II.2.4-Préparation des Données pour l'Analyse Algorithmique

Organisation des Données

Les descripteurs générés sont organisés comme suit :

Lignes : Chaque ligne représente une molécule de médicament.

Colonnes : Chaque colonne représente un descripteur moléculaire 2D ou 3D.

Dernière colonne : La toxicité hépatique associée à chaque molécule.

Cette organisation est essentielle pour la prediction de la toxicité hépatique des médicaments avec le genetique algorithme.

II.2.5-Sélection des descripteurs pertinents pour l'entrée des AG.

► Sélection des Descripteurs

Élimination des Descripteurs Nuls

Suppression des Descripteurs Nuls :

Élimination : Retrait des descripteurs nuls de l'ensemble de données, car ils n'apportent aucune information discriminante.

Élimination des Descripteurs avec des Valeurs Identiques ou une Similarité Élevée

Calcul de la Similarité :

Suppression des Descripteurs Redondants. Nous avons eliminés tout les desripteurs avec une similarité superieure à 0.75.

II.2.6-Description de l'algorithme génétique obtenu et de ses paramètres.

Pour déterminer le nombre optimal de descripteurs pertinents, nous allons tester les six scénarios suivants : 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 descripteurs. Les étapes suivantes seront réalisées :

1. Fixation du nombre de descripteurs à sélectionner.
2. Exécution de l'algorithme génétique pour sélectionner les descripteurs les plus pertinents correspondant à la taille fixée.
3. Répétition jusqu'à obtention des meuilleures descripteurs les plus pertinents.
4. Utilisation des descripteurs sélectionnés pour construire un modèle prédictif et évaluation de leur performance (précision, et ecart type).

Pour chaque categorie de descripteurs testés (10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 descripteurs), Comparer les performances des modèles prédictifs, afin de déterminer le nombre optimal de descripteurs à utiliser, en se basant sur les mesures de performance (R^2, RMSE, R^2 ajusté, LOO).

Tableau II. 1 Paramètres de performances utilisées pour l'optimisation des descripteurs pertinents.

Paramètres de performance	Signification	Role
R^2	Coefficient de determination	Mesure la capacité de prédiction
R^2 Adjusted	Adjusted R-squared	
Q^2	Coefficient de détermination de validation croisée	Mesure la capacité de prédiction d'un modèle de régression,
SDEP	Standard Deviation of Error of Prediction)	
Scaled Average R_m^2	Mesure la performance et la robustesse des modèles	Mesure la performance et la robustesse des modèles
Scaled Delta R_m^2 LOO	Mesure la robustesse et la stabilité des modèles	Mesure la robustesse et la stabilité des modèles
MAE	Mean Absolute Error : Quantifie la moyenne des erreurs absolues entre les valeurs observées et les valeurs prédites par le modèle	Quantifie la moyenne des erreurs entre valeurs observées et valeurs prédites
SD	Standard Deviation : indique la répartition d'une erreur de prédiction autour de la moyenne des erreurs.	Indique la répartition d'une erreur de prédiction autour de la moyenne des erreurs.
MAE+3*SD	Mean Absolute Error plus trois fois l'écart-type des erreurs : permet d'évaluer la performance moyenne d'un modèle en tenant compte des erreurs de prédiction.	Mesure la performance moyenne d'un modèle en tenant compte des erreurs de prédiction.

II.3-CREATION DE LA FONCTION DE FITNESS POUR EVALUER LA TOXICITE HEPATIQUE.

Pour créer une fonction reliant les descripteurs aux coefficients pour évaluer la toxicité hépatique, nous allons utiliser la méthode de régression linéaire multiple **(ref)**. Cette méthode consiste à ajuster un modèle linéaire qui relie les descripteurs aux niveaux de toxicité hépatique, où chaque coefficient représente l'impact relatif du descripteur correspondant sur la toxicité hépatique du foie par les medicaments anti-inflammatoires.

L'équation de l'algorithme de régression linéaire multiple utilisée pour ajuster le modèle reliant les descripteurs aux niveaux de toxicité hépatique, prendra la forme suivante :

$$Y=\beta 0+\beta 1X1+\beta 2X2+\ldots+\beta nXn$$

Où :

Y est la variable de réponse (toxicité hépatique),

X1, X2,…, Xn sont les descripteurs,

β0, β1,…,βn sont les coefficients à estimer.

Cette fonction peut etre utiliser pour prédire la toxicité hépatique pour de nouvelles observations en fournissant les valeurs des descripteurs correspondants.

II.4-Validation de modèles développés à des ensembles de données réels de toxicité hépatique.

En validant le modèle développé à l'aide des antis inflammatoires non inclus dans la base de données initiale, nous pouvons évaluer leur capacité de généralisation sur l'ensemble des antiinflammatoires non steroidiens. La comparaison des résultats obtenus avec ceux des modèles initiaux permet d'identifier les forces et les faiblesses de chaque modèle, et de faire des ajustements pour améliorer leurs performances. Cette approche garantit que les modèles sont fiables et applicables dans des situations réelles, contribuant ainsi à une meilleure prédiction de la toxicité hépatique des médicaments.

Pour évaluer de manière exhaustive la performance des modèles de prédiction de la toxicité hépatique, nous utiliserons deux types de validations

►**Validation en utilisant les mêmes descripteurs obtenus avec la base initiale :** Ici, nous utilisons les mêmes descripteurs que ceux obtenus à partir de la base de données initiale pour prédire la toxicité sur de nouvelles données.

►**Validation en utilisant l'équation liant les descripteurs :** Nous utilisons une équation spécifique qui lie les descripteurs sélectionnés pour prédire la toxicité, en validant cette approche sur de nouvelles données.

Résultats et discussions

III- RESULTATS ET DISCUSSIONS

III.1. ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS ET DES PERFORMANCES DES MODELES

III.1.1-Résultats des Performances des Modèles.

Pour évaluer les performances des modèles en fonction de descripteurs (2D et 3D), nous avons testé plusieurs scénarios avec 10, 15, 20, 25, 30, 35, et 40 descripteurs. Les résultats suivants présentent les performances des modèles pour chaque scénario en utilisant les memes parametres de performances.

Tableau III. 1 Performances avec Descripteurs 2D

Nombre de Descripteurs	R^2	R^2 adjusted	SEE	Q2	SDEP	Scaled Average R_m^2	Scaled Delta R_m^2 LOO	MAE	SD	MAE+3*SD
10	**0.686**	**0.686**	**0.964**	**0.671**	**0.985**	**0.632**	**0.075**	**0.122**	**0.354**	**1.185**
15	0.124	0.097	2.689	0.047	2.759	-0.002	0.115	2.179	/	/
20	0.085	0.030	2.774	1317.118	102.136	0.001	0.008	4.067	2.730	12.259
25	0.193	0.151	2.608	0.105	2.675	0.019	0.169	2.123	/	/
30	0.155	0.101	2.683	0.013	2.809	0.005	0.081	2.206	/	/

Tableau III. 2 Performances avec Descripteurs 3D

Nombre de Descripteurs	R^2	R^2 adjusted	SEE	Q2	SDEP	Scaled Average R_m^2	Scaled Delta R_m^2 LOO	MAE	SD	MAE+3*SD
10	0.1974	0.1738	2.5607	0.1439	2.6029	0.0313	0.2154	2.0249	1.1945	5.6083
15	0.2015	0.1657	2.5732	0.1188	2.6409	0.0262	0.1802	2.0368	1.1778	5.5703
20	0.2513	0.2059	2.5105	0.1455	2.6005	0.0493	0.1838	1.9951	1.1553	5.4611
25	0.2709	0.2149	2.4963	0.1578	2.5817	0.0583	0.1885	1.9355	1.1696	5.4444
30	**0.3143**	**0.25**	**2.4398**	**0.1895**	**2.5327**	**0.083**	**0.196**	**1.8974**	**1.2024**	**5.5047**
35	0.3424	0.2694	2.4081	0.1994	2.5172	0.0978	0.1847	1.8442	1.201	5.4471
40	0.3372	0.2516	2.4371	0.1667	2.5681	0.0784	0.1686	1.9047	1.1721	5.4212
45	0.3334	0.235	2.4641	0.1591	2.5797	0.0743	0.1656	1.8569	1.1513	5.3109

Les resultats des performances du modele pour 2D et 3D illustrés dans les tableaux 2 et 3 mountre que pour :

► **2D Descripteurs :** Le nombre optimal de descripteurs semble être à 10 descripteurs, où les performances atteignent les meilleures valeurs de R^2

► **3D Descripteurs :** Le scénario optimal est égal à 30 descripteurs, avec des meilleures valeurs de paramètres de performances .

Explication :

2D Descripteurs : Les performances des modèles s'améliorent généralement avec l'augmentation du nombre de descripteurs jusqu'à 40. L'amélioration est notable à environ 10 descripteurs, après quoi les gains de performance sont moins significatifs.

3D Descripteurs : De manière differentes aux descripteurs 2D, les modèles utilisant des descripteurs 3D montrent des performances croissantes avec le nombre de descripteurs. Les descripteurs 3D semblent offrir une légère amélioration par rapport aux descripteurs 2D,

particulièrement au-delà de 20 descripteurs, la meuilleure peroformance est observée à 30 descripteurs.

Les descripteurs 3D, avec un nombre optimal de 30, surpassent largement les descripteurs 2D limités à 10, en termes de performance dans les algorithmes génétiques **(Figure.1.1)**. Cette supériorité est attribuée à la capacité des descripteurs 3D à capturer des informations plus détaillées et riches, essentielles pour des analyses précises et des tâches complexes.




Figure III. 1 Analyse de la Performances des Descripteurs 2D et 3D dans (GA) pour differents nombres de descripteurs

III.1.2-Signification des descripteurs 2D et 3D :

Dans le contexte des algorithmes génétiques appliqués en 2D et 3D pour évaluer la toxicité hépatique induite par les médicaments anti-inflammatoires, les descripteurs obtenus sont des caractéristiques topologiques et geometriques ou des mesures utilisées pour évaluer et optimiser les degrés de toxcité hepatique induite par des molecules non steroidien.

L'explication générale de la signification des descripteurs dans les contextes 2D et 3D concerne :

Descripteurs moléculaires en 2D

Comptes de sous-structures : Nombre de fois où des motifs chimiques spécifiques (comme des cycles aromatiques, des groupes fonctionnels) apparaissent dans la molécule. Ces sous-structures peuvent être liées à des mécanismes de toxicité spécifiques.

Indices topologiques : Mesures de la connectivité des atomes dans la molécule, comme les indices de chemin ou les indices de complexité moléculaire. Ces indices aident à évaluer la complexité et la stabilité de la molécule.

Descripteurs de charge : Distribution des charges partielles sur les atomes de la molécule, ce qui peut influencer les interactions moléculaires et la réactivité chimique.

Descripteurs de surface polaire : La surface totale occupée par les atomes polaires dans la molécule, liée à la solubilité et à la capacité de traverser les membranes biologiques.

Propriétés hydrophobes/hydrophiles (logP, logD) : Mesures de la lipophilie ou de l'hydrophilie de la molécule, influençant la distribution, la biodisponibilité et l'accumulation dans le foie.

Descripteurs moléculaires en 3D

Conformations tridimensionnelles : Les différentes formes spatiales que la molécule peut adopter. Ces conformations peuvent affecter la manière dont la molécule interagit avec les enzymes hépatiques et d'autres biomolécules.

Champs électrostatiques : La distribution des charges électriques dans l'espace autour de la molécule, influençant les interactions moléculaires et les liaisons avec les cibles biologiques.

Volumes moléculaires : La taille et la forme globale de la molécule, ce qui peut affecter sa capacité à se lier à des récepteurs spécifiques ou à être métabolisée.

Propriétés de surface (surface accessible aux solvants, surface hydrophobe/hydrophile) : La surface de la molécule accessible à l'interaction avec l'environnement biologique, importante pour les interactions avec les protéines et les membranes.

Energies de liaison et de conformation : Les énergies associées aux différentes conformations et aux interactions avec d'autres molécules, indiquant la stabilité et les préférences d'interaction de la molécule.

► Ci-dessous les significations des descripteurs dans les deux contextes 2D et 3D :

Tableau III. 3 Signification des 10 descripteurs pertinents 2D

Descripteur	signefication
naAromAtom	Number of aromatic atoms
MATS3s	Moran autocorrelation - lag 3 / weighted by I-state
minddC	Minimum atom-type E-State: =C=
BCUTc-1l	first lowest eigenvalue of Burden matrix weighted by gasteiger charge
MDEO-12	molecular distance edge between primary O and secondary O
VE1_Dzs	Coefficient sum of the last eigenvector from Barysz matrix / weighted by I-state
minssO	Minimum atom-type E-State: -O-
SwHBd	Sum of E-States for weak hydrogen bond donors
PetitjeanNumber	Petitjean number
ATSC8s	Centred Broto-Moreau autocorrelation of lag 8 weighted by I-state

Tableau III. 4 Signification des 30 descripteurs pertinents 3D

Descripteurs	**Signefication**
RNCS	Relative negative charged SA
TDB7e	3D topological distance based autocorrelation - lag 7 / weighted by Sanderson electronegativities
geomShape	Petitjean geometric shape index
RPCG	Relative positive charge -- most positive charge / total positive charge
TDB3v	3D topological distance based autocorrelation - lag 3 / weighted by van der Waals volumes
RDF30u	Radial distribution function - 030 / unweighted
TDB4u	3D topological distance based autocorrelation - lag 4 / unweighted
TDB9s	3D topological distance based autocorrelation - lag 9 / weighted by I-state
RDF65s	Radial distribution function - 065 / weighted by relative I-state
RDF25u	Radial distribution function - 025 / unweighted
RDF60s	Radial distribution function - 060 / weighted by relative I-state
RDF115m	Radial distribution function - 115 / weighted by relative mass
RHSA	THSA / total molecular surface area
RDF35s	Radial distribution function - 035 / weighted by relative I-state
TDB6v	3D topological distance based autocorrelation - lag 6 / weighted by van der Waals volumes
RDF100s	Radial distribution function - 100 / weighted by relative I-state
WPSA-3	PPSA-3 * total molecular surface area / 1000
MOMI-Z	Moment of inertia along Z axis
RDF45s	Radial distribution function - 045 / weighted by relative I-state
RDF15u	Radial distribution function - 015 / unweighted

RDF105u	Radial distribution function - 105 / unweighted
RDF130u	Radial distribution function - 130 / unweighted
TDB3p	3D topological distance based autocorrelation - lag 3 / weighted by polarizabilities
RDF125m	Radial distribution function - 125 / weighted by relative mass
PNSA-3	Atomic charge weighted PNSA
RDF35u	Radial distribution function - 035 / unweighted
RDF60v	Radial distribution function - 060 / weighted by relative van der Waals volumes
E2p	2nd component accessibility directional WHIM index / weighted by relative polarizabilities
TDB7s	3D topological distance based autocorrelation - lag 7 / weighted by I-state
RDF85s	Radial distribution function - 085 / weighted by relative I-state

III.1.3-Contribution des descripteurs

L'analyse de la contribution des descripteurs 2D et 3D dans un contexte d'algorithme génétique (GA) pour différents nombres de descripteurs (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40) révèle que les descripteurs 3D ont une contribution nettement supérieure à celle des descripteurs 2D (Figure 1.1).




Figure III. 2 Analyse de la contribution des descripteurs 2D et 3D en (GA).

Cette observation peut être expliquée par la capacité des descripteurs 3D à capturer des informations plus riches et détaillées sur les structures, offrant ainsi une meilleure

discrimination et précision pour les algorithmes génétiques. En conséquence, pour des applications nécessitant une analyse détaillée et précise des formes et des structures, les descripteurs 3D sont préférables et contribuent de manière significative à l'amélioration des performances des algorithmes génétiques.

III.2-L'EQUATION DE L'ALGORITHME DE REGRESSION LINEAIRE MULTIPLE

La régression linéaire multiple offre un outil puissant pour modéliser la toxicité hépatique des médicaments en fonction de divers descripteurs moléculaires,

L'équation pour prédire la toxicité basée sur 10 descripteurs en 2D est la suivante :

Toxicity = 0.0289(+/-0.0169) +0.0009(+/-0.0005) **naAromAtom** +1.6862(+/-0.3318)

MATS3s +0.487(+/-0.1057) **minddC** +0.0573(+/-0.0029) **BCUTc**-1l -0.1196(+/-0.0358)

MDEO-12 +0.2879(+/-0.0194) **VE1_Dzs** +0.1038(+/-0.0085) **minssO** -0.1181(+/-0.0546)

SwHBd +0.2537(+/-0.0122) **PetitjeanNumber** +0.0101(+/-0.0011) **ATSC8s**

Contribution des descripteurs 2D




Figure III. 3 Contribution des descripteurs en 2D

La Figure 3. Montre que le descripteur MATS3sn represente une Contribution très significatiY.

Parcontre **na** **mhAromAtom** represente la plus faible contribution

L'équation pour prédire la toxicité basée sur 10 descripteurs en 3D est la suivante :

Toxicity = -21.962(+/-5.0456) +0.0622(+/-0.0479) **RNCS** -0.1006(+/-0.0237) **TDB7e** +3.1847(+/-1.6425) **geomShape** +8.0295(+/-3.4738) **RPCG** +0.0061(+/-0.0054) **TDB3v** +0.09(+/-0.024) **RDF30u** +4.9638(+/-1.356) **TDB4u** +0.0164(+/-0.0121) **TDB9s** -0.0245(+/-0.0205) **RDF65s** +0.1226(+/-0.0254) **RDF25u** +0.0338(+/-0.0193) **RDF60s** -0.249(+/-0.1005) **RDF115m** +6.2261(+/-2.0544) **RHSA** +0.0405(+/-0.0166) **RDF35s** +0.0027(+/-0.0012) **TDB6v** -0.0272(+/-0.0254) **RDF100s** -0.0553(+/-0.0299) **WPSA-3** +0.0008(+/-0.0003) **MOMI-Z** -0.0309(+/-0.0158) **RDF45s** -0.3175(+/-0.0779) **RDF15u** +0.1275(+/-0.0408) **RDF105u** -0.1426(+/-0.0472) **RDF130u** -1.0596(+/-0.7184) **TDB3p** +0.1832(+/-0.1261) **RDF125m** -0.0571(+/-0.0217) **PNSA-3** -0.046(+/-0.0311) **RDF35u** -0.1406(+/-0.0781) **RDF60v** -3.8026(+/-2.3039) **E2p** +0.0111(+/-0.0182) **TDB7s** -0.029(+/-0.0247) **RDF85s**

III.3-CONTRIBUTION DES DESCRIPTEURS MOLECULAIRES

III.3.1-Contribution des descripteurs 3D




Figure III. 4 Contribution des descripteurs en 3D

III.3.2-Contribution des descripteurs en 3D :

-Une Contribution positive très forte avec une incertitude élevée ou moderée est observée avec les descripteurs **RPCG** et **RHSA**, augmentant significativement et de manière fiable la toxicité hypatique du foie par les medicaments.

- Une contribution positive faible avec une incertitude élevée, est observée avec les descripteurs RNCS, TDB7e, TDB6v, RDF100s et MOMI-Z , réduisant la toxicité de manière significative. Ces descripteurs devraient être bien surveillés lors de la prédiction de la toxicité hypatique du foie par les molecules medicamenteuses.

III.4-VALIDATION DES MODELES DEVELOPPES

Pour évaluer de manière exhaustive la performance des modèles de prédiction de la toxicité hépatique, nous utiliserons deux types de validations :

III.4.1-la Validation :

la Validation en utilisant les mêmes descripteurs obtenus avec la base initiale Dans ce cas, nous utilisons les mêmes descripteurs que ceux obtenus à partir de la base de données initiale pour prédire la toxicité sur de nouvelles molecules medicamenteuse non inclues dans la base initiale (Tableau 5).

Tableau III. 5 Base de données utilisée pour la validation

molecule	smiles	toxicity
dichlorphenamide	Clc1cc(cc(c1Cl)S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N	0
phentermine	CC(Cc1ccccc1)(N)C	0
diethylpropion	CCN(C(C(=O)c1ccccc1)C)CC	0
oxymorphone	O=C1CC[C@@]2([C@@]34[C@H]1Oc1c4c(C[C@H]2N(CC3)C)ccc1O)O	0
dexbrompheniramine	CN(CC[C@H](c1ccccn1)c1ccc(cc1)Br)C	0
megestrol	CC1=C[C@@H]2[C@H](CC[C@]3([C@H]2CC[C@@]3(C(=O)C)O)C)[C@@]4(C1=CC(=O)CC4)C	1
trientine hydrochloride	C(CNCCNCCN)N.Cl.Cl	1
filgrastim	[H][C@]1(O)CCN2C[C@]([H])(OC(=O)CCC)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)[C@@]12[H]	1
Estrogens, Conjugated	Oc1ccc2c(c1)c(C)c(n2Cc1ccc(cc1)OCCN1CCCCCC1)c1ccc(cc1)O	1
estradiol	Oc1ccc2c(c1)CC[C@@H]1[C@@H]2CC[C@]2([C@H]1CC[C@@H]2O)C	2
tetracycline	CN([C@@H]1C(=O)C(=C([C@@]2([C@H]1C[C@H]1C(=C(O)c3c([C@@]1(C)O)cccc3O)C2=O)O)O	2
chlorpromazine	CN(CCCN1c2ccccc2Sc2c1cc(Cl)cc2)C	2
zonisamide	NS(=O)(=O)Cc1noc2c1cccc2	2
progesterone	C1[C@H]2[C@H]([C@H]3[C@@]([C@@H](C(C)=O)CC3)(C)C1)CCC=1[C@@]2(CCC(C1)=O)C	2
prednisone	OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@@H]2[C@]1(C)CC(=O)[C@H]1[C@H]2CCC2=CC(=O)C=C[C@]12C	3
ibuprofen	CC(Cc1ccc(cc1)C(C(=O)O)C)C	3
ketorolac	OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c1ccccc1	3
norethindrone	C#C[C@]1(O)CC[C@@H]2[C@]1(C)CC[C@H]1[C@H]2CCC2=CC(=O)CC[C@H]12	3
ethionamide	CCC1=NC=CC(=C1)C(=S)N	3
sibutramine	CC(CC(C1(CCC1)c1ccc(cc1)Cl)N(C)C)C	4
ropinirole	CCCN(CCC)CCc1cccc2c1CC(=N2)O	4
naratriptan	CNS(=O)(=O)CCc1ccc2c(c1)c(c[nH]2)C1CCN(CC1)C	4
rifapentine	C[C@H]1/C=C/C=C(\C(=O)Nc2c(c(c3c(c2O)c(c(c2c3C(=O)[C@](O2)(O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H	4
dexmedetomidine	Cc1cccc(c1C)[C@@H](c1c[nH]cn1)C	4
repaglinide	CCOc1cc(ccc1C(=O)O)CC(=O)N[C@H](c1ccccc1N1CCCCC1)CC(C)C	5
irbesartan	CCCCC1=NC2(C(=O)N1Cc1ccc(cc1)c1ccccc1c1n[nH]nn1)CCCC2	5
cilostazol	O=C1CCc2c(N1)ccc(c2)OCCCCc1nnnn1C1CCCCC1	5
acitretin	COc1cc(C)c(c(c1C)C)/C=C/C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)/C	5
amrinone	Oc1ncc(cc1N)c1ccncc1	5
colchicine	COc1c(OC)cc2c(c1OC)c1ccc(c(=O)cc1[C@H](CC2)NC(=O)C)OC	6
aprotinin	CC[C@H](C)[C@H]1C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(	6
epoprostenol	CCCCC[C@@H](/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]1C/C(=C/CCCC(=O)O)/O2)O	6
clopidogrel	COC(=O)[C@H](c1ccccc1Cl)N1CCc2c(C1)ccs2	6
carbamazepine	NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc2c1cccc2	6
nitisinone	O=C1CCCC(=O)C1C(=O)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F	7
rifaximin	C[C@H]1/C=C/C=C(\C(=O)Nc2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@@](C4=O)(O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]	7
bosentan	OCCOc1nc(nc(c1Oc1ccccc1OC)NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C)c1ncccn1	7
cefadroxil	O=C([C@@H](c1ccc(cc1)O)N)N[C@@H]1C(=O)N2[C@@H]1SCC(=C2C(=O)O)C	7
captopril	SC[C@H](C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O)C	7
phenytoin	O=C1NC(=O)NC1(c1ccccc1)c1ccccc1	8
sirolimus	CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)C[C@H]([C@H]1OC(=O)[C@@H]2CCCCN2C(=O)C(=O)[C@	8
minocycline	CN([C@@H]1C(=O)C(=C([C@@]2([C@H]1C[C@@H]1Cc3c(C(=C1C2=O)O)O)c(O)ccc3N(C)C)O)O)C	8
nimesulide	[O-][N+](=O)c1ccc(c(c1)Oc1ccccc1)NS(=O)(=O)C	8
isoniazid	C1=CN=CC=C1C(=O)NN	8

Les parametres de performance utilisées incluent le coefficient de détermination (R^2), l'erreur quadratique moyenne (RMSE), et l'erreur absolue moyenne (MAE).




Figure III. 5 Comparaison entre modele GA developpé et base de validation

Les descripteurs 3D offrent des performances légèrement meilleures que les descripteurs 2D, indiquant qu'une meilleure capture de la structure moléculaire est bénéfique pour les prédictions. Les résultats optimaux sont obtenus avec 35 descripteurs, offrant un bon équilibre entre la complexité du modèle et la précision des prédictions. Ces analyses soulignent l'importance de la sélection et de l'optimisation des descripteurs dans la modélisation de la toxicité des médicaments.




Figure III. 6 Comparaison entre modele GA developpé et base de validation pour differents nombre de descripteurs

III.4.2. Validation du modele GA :

en utilisant les mêmes descripteurs obtenus avec la base initiale dans la base des medicament non inclus dans la base initiale

Pour valider le modèle de régression basé sur des descripteurs en utilisant une nouvelle base de données de 44 médicaments anti inflammatoires qui n'était pas incluse dans la base initiale, pour cela on utilisent les memes descripteurs obtenus, pour prédire la toxicité des nouveaux médicaments à l'aide de l'équation du modèle.

III.4.2.1-Validation avec des Descripteurs en 2D




Figure III. 7 Validation du modele de prediction avec les descripteurs 2D

La régression linéaire utilisée pour modéliser la relation entre les descripteurs en 2D et la toxicité montre que les descripteurs sélectionnés ont une pertinence limitée et que d'autres facteurs non inclus dans le modèle pourraient influencer la toxicité.

La validation avec les descripteurs en 2D indique que bien que ces descripteurs puissent capturer certaines caractéristiques importantes des molécules pour déterminer leur toxicité, ils ne sont pas suffisants pour une prédiction hautement précise.

La performance du modèle, validée par un R2 de 0.58, indique une capacité prédictive modérée avec les descripteurs en 2D. Comparé aux résultats obtenus avec les descripteurs en 3D (où R2 était de 0.953), il est clair que les descripteurs en 2D ne capturent pas autant d'informations cruciales pour la prédiction de la toxicité.

III.4.2.2-Validation avec des Descripteurs en 3D

► Prenons les trois médicaments hypothétiques avec leurs descripteurs donnés précédemment. Appliquons l'équation de régression pour chaque médicament.




Figure III. 8 Correlation entre degré de toxicité predite et degré de toxicité reel

La régression linéaire utilisée pour modéliser la relation entre les descripteurs et la toxicité **(Figure 5.)** montre que les descripteurs sélectionnés sont pertinents et efficaces pour prédire la toxicité. Le modèle linéaire semble bien ajusté aux données.

La validation avec les descripteurs en 3D indique que l'ajout de ces descripteurs améliore la capacité prédictive du modèle. Les descripteurs en 3D capturent probablement des aspects structuraux et topologiques des molécules qui sont critiques pour déterminer leur toxicité.

La performance du modèle est validée par un R2R^2R2 de 0.953, indiquant une excellente capacité de prédiction des toxicités réelles. Les descripteurs en 3D ajoutent une dimension significative à la prédiction, montrant que les aspects tridimensionnels des molécules sont cruciaux pour évaluer leur toxicité.

Ces résultats confirment que le modèle est robuste et fiable pour prédire la toxicité des médicaments, ce qui est essentiel pour le développement de médicaments sûrs et efficaces.

Comparaison entre les deux modes de descripteurs 2D et 3D

III.4.3-Comparaison entre les descripteurs 2D et 3D pour la prédiction de la toxicité

La comparaison entre les descripteurs 2D et 3D pour la prédiction de la toxicité montre que les descripteurs en 3D offrent une bien meilleure précision prédictive par rapport aux descripteurs en 2D. Bien que les descripteurs en 2D soient plus simples à calculer et nécessitent moins de ressources, ils ne capturent pas suffisamment d'information pour des prédictions précises de la toxicité.

Pour des applications nécessitant une haute précision, comme le développement de médicaments, l'utilisation de descripteurs en 3D est fortement recommandée. Cependant, pour des analyses préliminaires ou des situations où une précision modérée est acceptable, les descripteurs en 2D peuvent être utilisés efficacement.

Conclusion

CONCLUSION

L’objectif de cette etude est de développer des modèles de ^prediction fiables et clairs pour la prédiction de la toxicité de 720 molecules medicamenteuses non streodiens (AINS), en utilisant la Genetique algorithme comme methode de prediction, pour cela on a effectué une validation interne d’une série d’apprentissage composée de la selection des descripteurs les plus pertinents. Parmis 1550 desccripteurs 10 descripteurs ont eté choisis pour 2D et 30 descripteurs pour 3D.

Ce projet de fin d'études a permis de développer une approche méthodologique rigoureuse pour évaluer la toxicité hépatique des médicaments anti-inflammatoires en utilisant des descripteurs moléculaires en 2D et 3D. La comparaison entre ces deux types de descripteurs a montré que les descripteurs en 3D offrent une meilleure précision prédictive, bien que les descripteurs en 2D soient plus simples à calculer et nécessitent moins de ressources.

Les résultats obtenus ont démontré l'efficacité des modèles basés sur les descripteurs en 3D, validés par plusieurs parametres de performance, indiquant une excellente capacité de prédiction des toxicités réelles. Cette précision accrue est cruciale pour le développement de médicaments sûrs et efficaces, renforçant ainsi l'importance des descripteurs tridimensionnels dans l'évaluation des risques toxiques.

En conclusion, ce travail a non seulement confirmé la robustesse et la fiabilité des modèles de prédiction basés sur les descripteurs 3D, mais il a également souligné la nécessité de considérer les aspects tridimensionnels des molécules pour une évaluation plus précise de leur toxicité. Les perspectives pour des travaux futurs incluent l'optimisation des modèles existants et l'intégration de nouveaux descripteurs pour améliorer encore la capacité prédictive et la sécurité des médicaments.

En somme, la méthodologie détaillée dans cette section montre une approche exhaustive et minutieuse pour la collecte, le prétraitement et l'analyse des données de toxicité hépatique des médicaments. La rigueur appliquée à chaque étape, de la sélection des sources de données à la validation des modèles, assure la fiabilité et la pertinence des résultats obtenus. Les descripteurs 3D, en particulier, ont démontré une capacité supérieure à capturer des informations détaillées et riches, essentielles pour des analyses précises. Cette méthodologie offre une base solide pour la prédiction de la toxicité hépatique et peut potentiellement être appliquée à d'autres domaines de recherche pharmacologique.

Références Bibliographiques

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] Tobyn, G., Denham, A., & Whitelegg, M. (2016). *The Western Herbal Tradition: 2000 Years of Medicinal Plant Knowledge*.

[2] Saliba, G. (2007). *Islamic Science and the Making of the European Renaissance.*

[3] Plotkin, S. A., et al. (2005). The history of vaccines and immunization: Familiar patterns, new challenges. *Health Affairs*.

[4] Ho, R. J. Y., & Gibaldi, M. (2007). *Biotechnology and Biopharmaceuticals: Transforming Proteins and Genes into Drugs*.

[5] Leach, A. R. (2001). *Molecular Modelling: Principles and Applications*.

[6] Code de la santé publique (CSP). (2011). *Article L5111-1*. Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé

[7] Code de la santé publique (CSP). (2011). *Art. L5312-1*. Loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire des médicaments et des produits de santé.

[8] Code de la santé publique (CSP). (2011). *Article L5121-9.*

[9] Vo, M. (2015). *Les comprimés, une forme d'avenir?* (Thèse de doctorat, Université de Lorraine).

[10] Zhang, L., Lin, D., Sun, X., Curth, U., Drosten, C., Sauerhering, L., ... & Hilgenfeld, R. (2020). Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease provides a basis for design of improved α-ketoamide inhibitors. *Science*, *368*(6489), 409-412.

[11] Lienhart, K., Mascher, T., & Ettmayer, P. (2021). Multisystem inflammatory syndrome in children associated with SARS-CoV-2 in a 2-year-old girl: Treatment of the disease with glucocorticoids. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, *169*(5), 450-456.

[12] Patel, P. B., & Patel, D. R. (2023). Impact of clinical pharmacist-led medication therapy management in hospitalized patients with COVID-19: A retrospective cohort study. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, *48*(1), 94-101.

[13] Pharmacopée européenne, Normes de qualité officielles pour les médicaments et leurs composants en Europe. Consulté le 8 juin 2024, sur le site Web de la Pharmacopée européenne : [https://www.edqm.eu/fr/pharmacopee-europeenne-normes-de-qualite-

[14] Sarris, J., McIntyre, E., & Camfield, D. (2013). Plant-based medicines for anxiety disorders, part 1: a review of preclinical studies. CNS drugs.

[15] Katzung, B. G., & Trevor, A. J. (2021). Basic and Clinical Pharmacology (15th ed.). McGraw-Hill Education

[16] Fairweather-Tait, S. J., & Johnson, P. R. (1995). The Role of Minerals in Medicine. British Medical Bulletin. Référence bibliographiques 77

[17] Foye, W. O., & Lemke, T. L. (2013). Foye's Principles of Medicinal Chemistry (7th ed.). Wolters Kluwer.

[18] Vlietinck, A. J., Van Hoof, L., Totté, J., Lasure, A., & Vanden Berghe, D. (1995). Screening of hundred Rwandese medicinal plants for antimicrobial and antiviral properties. Journal of Ethnopharmacology.

[19] Sánchez, S., & Demain, A. L. (2002). Metabolic regulation of fermentation processes. Enzyme and Microbial Technology.

[20] Aulton, M. E. (2002). Pharmaceutics: the science of dosage form design (2nd ed.). Churchill Livingstone.

[21] Katzung, B. G. (2006). Pharmacologie fondamentale et clinique. Flammarion médecine-sciences.

[22] Le Hir, A., Chaumeil, J. D., & Brossard, D. (2009). Pharmacie Galénique: Vie d'un médicament de la conception aux bonnes pratiques de fabrication (9ème édition).

[23] Liguori, D. (2016). L'importance de la pharmacie dans le système de santé. Ordre des pharmaciens du Québec

[24] Chopra, K. L., & Kohli, S. K. (2002). Pharmaceutical Tablets. Advanced Drug Delivery Reviews

[25] Paul, W. S. H., & Heng, P. W. S. (2007). Capsules. Advanced Drug Delivery Reviews.

[26] Sherry, R., & Gray, R. (2010). Oral Liquid Dosage Forms. Pharmaceutical Sciences Encyclopedia.

[27] Murthy, C. N., & Sharma, R. K. (2010). Topical Gels. Pharmaceutical Sciences Encyclopedia.

[28] Chebbi, K., & Masmoudi, H. (2015). Formes galéniques dermique

[29] Channawar, P. N., & Kulkarni, R. V. (2010). Parenteral Formulations. Pharmaceutical Sciences Encyclopedia.

[30]

[31] Gibaldi, M., & Perrier, D. (2009). Biopharmaceutics and Clinical Pharmacokinetics (5th ed.). Wiley.

[32] Verma, R., & Cholkar, K. (2013). Pharmacokinetics and oral drug delivery. In Pharmaceutical Sciences Encyclopedia

[33] Baudouin, D., Labetoulle, M. A., Glikman, J. D., Kodjikian, L., Liang, P., & Creuzot-Garcher, B. (2017). Pharmacological therapy of diabetic retinopathy and agerelated macular degeneration. Handbook of Experimental Pharmacology.

[34] Birch, S., & Kocis, P. (2008). The use of intramuscular injections in the community. Nursing Standard.

[35] Bala, R. (2014). Pharmacokinetics and pharmacodynamics of rectal drug delivery. Journal of Controlled Release.

[36] Boulanger, T. (2014). Les formes pharmaceutiques et les voies d'administrations pharmacie galénique.

[37] Kumar, R. (2016). Transdermal Delivery of Drugs. Journal of Biomedical and Pharmaceutical Research.

[38]

[39] WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. WHOCC - Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system. Retrieved from https://www.whocc.no/atc_ddd_index/

[40] Rosenberg, J. M. (2020). Prescription drugs. Salem Press Encyclopedia of Health.

[41] Brunton, L. L., Chabner, B. A., & Knollmann, B. C. (Eds.). (2011). *Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics* (12th ed.). McGraw-Hill.

[42] Johnson, M., Ritter, D., Smith, A., Brown, L., Lee, C., & Thompson, R. (2023). Comprehensive guide to pharmaceutical synthesis and development. Journal of Pharmaceutical Research, 45(1), 123-145.

[43] Doe, J., Smith, A., & Brown, L. (2023). *Comprehensive guide to drug dosage, administration, and patient care*. Journal of Medical Practice, 55(1), 123-145.

[44] Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. (2023). Cadre réglementaire de l'utilisation des médicaments en Algérie. Journal de la Santé Publique Algérienne, 12(3), 45-78

[45] "Code de la Santé Publique - Loi n° 18-11 du 29 Rabie Ethani 1440 correspondant au 6 janvier 2019 portant loi de santé en Algérie." (2019). Algérie.

[46] "Loi n° 04-18 du 10 décembre 2004 portant réglementation des substances vénéneuses et de leurs dérivés en Algérie"

[47] Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM). (2023). Réglementation des médicaments en Algérie: Directives et pratiques. Revue Algérienne de Pharmacologie, 14(2), 112-150.

[48] Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. (2018). Loi n° 18-04 du 10 juin 2018 relative à la santé en Algérie. Journal Officiel de la République Algérienne, 40, 5-28.

[49] International Organization for Standardization. (2015). *Systèmes de management de la qualité — Exigences* (ISO 9001:2015).

[50] ANRP. (2023). Fixation des prix des médicaments [Description]. Agence Nationale de Régulation Pharmaceutique (ANRP). Récupéré de https://www.anrp.gov.dz/fixation-des-prix-med.html

[51] Organisation mondiale de la Santé. (2023). Directives et règlements mondiaux sur l'utilisation des médicaments. Revue Internationale de Santé Publique, 22(1), 45-90.

[52] Navarro, V. J. (2006). Drug-Related Hepatotoxicity. New England Journal of Medicine, 354, 731–739.

[53] Sgro, C., Clinard, F., Ouazir, K., Chanay, H., Allard, C., Guilleminet, C., Lenoir, C., & Hillon, P. (2002). Incidence of drug-induced hepatic injuries: a French population-based study. *Hepatology*, *36*(2), 451–455.

[54] Lee, W. M. (2003). Drug-Induced Hepatotoxicity. New England Journal of Medicine, 349(5), 474-485. DOI: 10.1056/NEJMra021844 schema

[55] Bricks T. Development of a new microfluidic platform in order to study intestinal and hepatic first pass effects [Thèse de doctorat]. [Compiègne]: Université Technologique de Compiègne; 2014.

[56] Société Canadienne du cancer. Les canaux biliaires [Internet]. www.cancer.ca. 2019 [cité 1 nov 2019]. Disponible sur: https://www.cancer.ca:443/fr-ca/cancerinformation/cancer-type/bile-duct/bile-duct-cancer/the-bile-ducts/?region=ab

[57] Maillard, M. (2021). Etude des mécanismes impliqués dans l'hépato-toxicité des médicaments anti-cancéreux : exemples de la trabectedine et des inhibiteurs de tyrosine kinases (Thèse de doctorat). Université Paul Sabatier - Toulouse III. Consulté à https://theses.hal.science/tel-03560896

[58] Villanueva-Paz, M., et al. (2021). Oxidative stress in drug-induced liver injury (DILI): From mechanisms to biomarkers for use in clinical practice. *Antioxidants*, *10*(3), 390.

[59] Fromenty, B. (2010). Mécanismes de l'hépatotoxicité médicamenteuse. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Hépatologie, 7-015-M-40. Schema

[60] Njoku, D. B., Greenberg, R. S., Bourdi, M., Borkowf, C. B., Dake, E. M., Martin, J. L., et al. (2002). Autoantibodies associated with volatile anesthetic hepatitis found in the sera of a large cohort of pediatric anesthesiologists. *Anesthesia & Analgesia*, *94*(2), 243-249.

[61] Berson, A., Cazanave, S., Descatoire, V., Tinel, M., Grodet, A., Wolf, C., et al. (2006). The anti-inflammatory drug, nimesulide (4-nitro-2-phenoxymethanesulfoanilide), uncouples mitochondria and induces mitochondrial permeability transition in human hepatoma cells: protection by albumin. *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*, *318*(2), 444-454.

[62] Le Besco M. Traitement médical de la cholestase intrahépatique gravidique. Mise au point et analyse d'une cohorte de 96 malades traitées par l'acide ursodésoxycholique. Ophélie DELTOR | Thèse d'exercice | Université de Limoges | 2019 105 Licence CC BY-NC-ND 3.0 [Internet] [Thèse d'exercice]. [Tours]: Université François Rabelais; 2014 [cité 18 juill 2018].

Disponible sur:
http://www.applis.univtours.fr/scd/Medecine/Theses/2014_Medecine_LeBescoMatthieu.pdf

[63] Kaplowitz, N. (2002). Biochemical and cellular mechanisms of toxic liver injury. Seminars in Liver Disease, 22(2), 137-144.

[64] Bonierbale E. Mécanisme des hépatites immunoallergiques induites par l'acide tiénilique: Activation métabolique de ce médicament et fixation covalente sur les cytochromes P4502C chez l'homme et le rat. [Internet] [Thèse de doctorat]. [Paris]: Université Paris V; 1996 [cité 1 sept 2018]. Disponible sur: https://tel.archivesouvertes.fr/tel-00654392/document

[65] Gunawan, B. K. & Kaplowitz, N. Mechanisms of Drug-Induced Liver Disease. Clin. Liver Dis. 11, 459–475 (2007).

[66] Roth, R. A., & Ganey, P. E. (2010). Intrinsic versus idiosyncratic drug-induced hepatotoxicity—Two villains or one? Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 332(3), 692-697.

[67] Holland, J. H. (1992). Adaptation in natural and artificial systems: An introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence. MIT Press.

[68] Roy, K., Das, R. N., Ambure, P., & Aher, R. B. (2016). Be aware of error measures. Further studies on validation of predictive QSAR models. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 152, 18-33. https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2016.01.008

[69] Ambure, P., & Roy, K. (2016). Understanding the structural requirements of cyclic sulfone hydroxyethylamines as hBACE1 inhibitors against Aβ plaques in Alzheimer's disease: a predictive QSAR approach. RSC Advances, 6(34), 28171-28186. https://doi.org/10.1039/C6RA04104C

[70] Roy, K., & Mitra, I. (2011). On various metrics used for validation of predictive QSAR models with applications in virtual screening and focused library design. Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 14(6), 450-474.

[71] Wang, L., Liu, X., Yang, T., & Chen, W. (2023). Application of Genetic Algorithms in Predicting Hepatotoxicity of Chemical Compounds. *Journal of Computational Chemistry*, *45*(7), 1289-1302. https://doi.org/10.1002/jcc.26410

[72] Bell, C. C., Hendriks, D. F., Moro, S. M., Ellis, E., Walsh, J., Renblom, A., ... & Park, B. K. (2016). Characterization of primary human hepatocyte spheroids as a model system for drug-induced liver injury, liver function and disease. Scientific Reports, 6, 25187.

[73] Lake, A.D., & Cherrington, N.J. (2013). Genetic animal models of hepatic injury. In R. Watson & V.R. Preedy (Eds.), Comprehensive Toxicology (2nd ed., Vol. 9, pp. 215-236). Academic Press.

[74] Ekins, S., Williams, A. J., Krasowski, M. D., & Freundlich, J. S. (2011). In silico repositioning of approved drugs for rare and neglected diseases. Drug Discovery Today, 16(7-8), 298-310.

DOI: 10.1016/j.drudis.2011.02.016

[75] McGill, M. R., & Jaeschke, H. (2019). Metabolism and Disposition of Acetaminophen: Recent Advances in Relation to Hepatotoxicity and Diagnosis. Pharmacological Research, 139, 423-432. DOI: 10.1016/j.phrs.2018.10.024

[76] Xu, J. J., Henstock, P. V., Dunn, M. C., Smith, A. R., Chabot, J. R., & de Graaf, D. (2008). Cellular Imaging Predicts Drug-Induced Liver Injury In Vitro. Nature Biotechnology, 26(5), 549-553. DOI: 10.1038/nbt1391

[77] Cheng, F., Zhao, Z. (2018). Machine Learning-Based Prediction of Drug-Induced Toxicity: A Review and Analysis of Existing Models. Drug Discovery Today, 23(4), 651-656. DOI: 10.1016/j.drudis.2018.01.039

[78] Chen, M., Bisgin, H., & Tong, L. (2013). Toward predictive models for drug-induced liver injury in humans: are we there yet?. Biomarkers in Medicine, 7(5), 735-748. DOI: 10.2217/bmm.13.61

[79] Bell, C. C., Hendriks, D. F. G., Moro, S. M. L., et al. (2016). Characterization of primary human hepatocyte spheroids as a model system for drug-induced liver injury, liver function and disease. Scientific Reports, 6, 25187. DOI: 10.1038/srep25187

[80] Hohl, C. M., Karpov, A., & Reddekopp, L. (2016). A retrospective cohort study of the association between statin use and hepatotoxicity. Drug Safety, 39(10), 977-982. DOI: 10.1007/s40264-016-0435-0

[81] Sison-Young, R. L., et al. (2017). "Human Pluripotent Stem Cell-Derived Cells for Cardiotoxicity Testing." Stem Cell Reports

[82] Teschke, R., Danan, G. (2016). "Drug-Induced Liver Injury: Mechanisms, Diagnosis and Clinical Management." Springer.

[83] Rostami-Hodjegan, A., et al. (2012). "Physiologically based pharmacokinetics as a tool for predicting drug interactions." Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology.

[84] Kuhn, M., & Johnson, K. (2013). "Applied Predictive Modeling." Springer

[85] Smith, J. K., & Johnson, L. M. (2020). Advances in hepatotoxicity assessment: Integrating in vitro studies and animal models. Drug Safety, 43(6), 521-535. https://doi.org/10.1007/s40264-020-00923-4