RECOMMANDATION

Un élevage de lapin surtout intensif présentent toujours le risque de coccidiose, cette maladie redoutable et dangereuse dans les élevages cunicoles, les lapins répondent à cette maladie par des dérangements digestifs, caractérisés principalement par de la diarrhée. Dans le but de parer cette parasitose redoutable, il faut mener une lutte sur un double front à la fois sanitaire et médical tout en prêtant attention au nettoyage et à la désinfection.

Les mesures sanitaires consistent en :

- Entretenez en permanence une hygiène parfaite des clapiers et du petit matériel utilisé en les nettoyant et en les désinfectant le plus régulièrement et fréquemment possible (2 fois par semaine).
- Eviter de distribuer l'aliment sur le sol en utilisant des récipients (mangeoires, râteliers) facile à nettoyer.
- Bruler les litières et flamber les fonds des cages.
- Minimiser les agents de stress (interventions à horaires régulières).
- Tout lapin étranger de plus de 25 jours doit subir une quarantaine avant d'être introduit dans un élevage.

Les mesures médicales :

Les mesures médicales qui peuvent être utilisées pour diminuer le risque d'atteinte sont la chimio prévention et la vaccination (Salinomycine, Robenidine).

La chimio prévention consiste en l'utilisation d'un anticoccidien en supplément dans l'aliment, très efficace contre les Eimeria les plus pathogènes en l'occurrence (*E.flavescens*, et *E.intestinalis*), il réduit l'importance de la coccidiose dans les élevages rationnels, en revanche l'utilisation abusive de ce dernier a rendu possible le développement de la chimiorésistance pour certaines espèces telles que (*E.magna*, *E.media* et *E.perforans*) les anticoccidiens coccidiostatiques restent la molécule de choix pour prévenir contre les espèces les plus pathogènes. Nous préconisons leur utilisation avec d'autres molécules telles que la Salinomycine alternativement afin de réduire les risques de chimiorésistance.